

*Juniperus thurifera*

Fuente de la Sabina (Letur), WH 7132, 1.220 m.

El Sabinar (Moratalla), WH 7429, 1.200 m.

Solamente han quedado registrados los topónimos relativos a *Juniperus thurifera*, sin encontrar explicación del por qué no ha ocurrido lo mismo con *J. phoenicea* o *J. oxycedrus*.

*Pistacia lentiscus*

Cortijo de los lentiscales (Moratalla), WH 9941, 620 m.

Cerro del Nantiscal (Socovos), WH 8939, 900 m.

Cañada del Lentiscar (Hellín-Socovos), XH 0449, 540 m.

Cortijo del Lentiscar (Férez), WH 8946, 650 m.

En este caso, los topónimos van más dirigidos a la formación vegetal que a la presencia esporádica de la especie, lo cual indica su amplia extensión en el territorio. Curiosamente, aunque suele ir acompañado del chaparro (*Quercus coccifera*), no hemos hallado registro toponímico alguno para este último taxon. Tampoco hemos encontrado referencia alguna sobre la recolección de la «lentisquina», de gran interés para la obtención de aceite en la Edad Media.

*Arbutus unedo*

Cortijo Madroño de la umbría (Socovos), WH 8640, 800 m.

Cortijo Madroño de la solana (Socovos), WH 8641, 800 m.

El Madroñar (Elche de la Sierra), WH 8855, 560 m.

El Madroñar (Moratalla), WH 9738, 800 m.

En el caso de la última referencia, existe constancia de dicha formación, casi monoespecífica, que contenía ejemplares viejísimos casi arbóreos: «con uno se hacía una carga de leña». Estos bosquetes fueron destruidos por lugareños de Tazona en décadas pasadas, a veces para carbón, otras para leña.

*Olea europaea*

Casas del acebuchar (Férez), WH 9053, 650 m.

El acibuchal (Socovos), WH 8842, 680 m.

El acebuchar (Socovos), WH 9842, 600 m.

Barranco del acebuchar (Férez), WH 9551, 600 m.

Es dudoso que la variedad silvestre medrara de forma abundante por estos lugares, posiblemente la toponimia haga referencia más a ejemplares asilvestrados.