

observado en la citada rambla. Su presencia actual es claramente reléctica restringida a la Presa del Cenajo.

*Sambucus nigra*

Collado del Sabuco (Letur), WH 7534, 1.200 m.

*Genista spartioides subsp. retamoides*

El Algaidón (Moratalla), XH 0342, 650 m.

Sierra del Algaidón (Moratalla), XH 0342, 600 m.

Loma de los Aznachares (Férez), WH 9554, 650 m.

El topónimo «aznuchar» podría referirse también a una comunidad dominada por *Ephedra fragilis*, pero parece más probable que en este caso se trate de *Genista spartioides subsp. retamoides*, cuya presencia reléctica ha podido ser comprobada recientemente en estas sierras manchego-murcianas (SÁNCHEZ GÓMEZ & ALCARAZ *op. cit.*). Esta especie ya viene mencionada en el Diccionario de Tomás López.

*Nasturtium officinale*

Fuente de los Berros (Férez), WH 8848, 650 m.

TOPÓNIMOS RELATIVOS A ESPECIES INDETERMINADAS O DUDOSAS

– Barranco de la Melera (Socovos), WH 8739, 800 m.

– Sierra de los Estepares (Letur), WH 7338, 1.197 m.

– Llano Jaral (Socovos), WH 8642, 800 m.

Bajo el nombre de estepa o estopa se conocen algunas jaras, sobre todo *Halimium atriplicifolium* y *Cistus albidus*. Por otro lado, en el Llano del Jaral se ha comprobado la existencia de algunos individuos de *Cistus ladanifer*.

– Cerro de los Gamonares (Moratalla), XH 0140, 700 m.

Posiblemente hace referencia a las extensas formaciones de *Asphodelus ramosus*.

– El juncal (Socovos), WH 9042, 650 m.

– Los prados (Moratalla), WH 8736, 900 m.

– Los prados altos (Socovos), WH 8542, 900 m.

– El Peralejo (Letur), WH 7848, 600 m.

– Los Peralicos (Moratalla), WH 9738, 800 m.

Dado que estos dos últimos lugares se encuentran en zona montañosa, no es incongruente sostener que tal vez los topónimos estén denotando la presencia