

Su presencia en localidades muy próximas a las sierras béticas albacetenses, nos hace incluirla en este catálogo ya que presumimos que también se encontrará en nuestra provincia. COBOS (1986) lo cita como parásito secundario de *Pinus nigra laricius* también existente en localidades serranas de la provincia.

*Anthaxia segurensis* Obenberger, 1924

Este bupréstido es un endemismo ibérico que fue descrito por J. Obenberger sobre ejemplares de Molinicos y que según COBOS (1986) hasta que él lo encontró en la localidad de Los Rasos de la Sierra de Cazorla sólo era conocida de la localidad albacetense antes citada.

La biología de esta especie es hasta ahora muy poco conocida. COBOS (1986) presume que puede ser pinícola por la abundancia de pinares en las zonas de captura.

Todavía COBOS (1986) manifiesta sus dudas sobre la existencia de esta especie dada su proximidad a *A. sepulchralis* (Fabricius) muy abundantes en todos los pinares de la Península Ibérica, por lo que recomienda profundizar en el estudio de los ejemplares de *Anthaxia* de la localidad típica.

*Anthaxia candens* (Panzer), 1789

Según A. COBOS (1986) esta especie se compone de dos razas geográficas bien caracterizadas: *ssp. candens* Panzer y la *ssp. lucens* Kuster; siendo ambas muy semejantes sólo diferentes en caracteres morfo-cromáticos y de talla media. Los ejemplares ibéricos pertenecen a la *ssp. candens*.

Incluimos esta especie en el catálogo ya que la única cita conocida en la Península Ibérica corresponde a la localidad de Molinicos (A. Cobos, julio, 1 macho y una hembra). Para COBOS (1986) es una especie muy rara al parecer en estado de reliquia.

Distribución geográfica:

*ssp. candens*, Europa central y meridional-occidental.

*ssp. lucens*, Europa meridional y centro-occidental y Oriente Medio.

Según COBOS (1986) se encuentra sobre Rosáceas arborescentes espontáneas y cultivadas entre los que cita *Prunus mahaleb* abundante en las zonas altas del Calar del Mundo.

*Acmaeodera rubromaculata* Lucas, 1844

*ssp. segurensis* Escalera, 1904

Esta especie constituye un gran complejo racial propio del mediodía occidental paleártico, alcanzando Canarias (COBOS, 1986).

La *ssp. segurensis* descrita por Escalera de la localidad serrana de El Pardal.