

Se encuentra en la parte oriental de la Península Ibérica siendo más rara hacia al norte.

COBOS (1986) cita a esta especie como parásita de *Thymelaea hirsuta* L.

*Aphanisticus distinctus* Perris, 1864

Elemento mediterráneo-occidental. Es una rara especie que fue citada de El Pardal y Molinicos.

Según COBOS (1986) a la larva como al imago se les encuentra sobre juncos.

## SUPERFAMILIA SCARABAEOIDEA ESCARABEIDOS

Familia *TROGIDAE*

*Glaresis hispanus* Báguena, 1959

Especie sólo conocida por el ejemplar tipo de Mazarrón (Murcia) sobre el que fue descrita. La hemos capturado en las lagunas de los Ojos de Villaverde en el mes de julio de 1988 atraída por la luz artificial. Hasta esta fecha, en la que capturamos dos hembras, los individuos de este sexo eran desconocidos para la ciencia. También la hemos localizado en Jumilla (Murcia) en el mes de junio de 1989 (34 ejemplares).

Familia *OCHODAEDIDAE*

*Ochodaeus inermis* Reitter, 1892

Esta especie es un endemismo ibérico que por su rareza y escasez lo incluimos en la presente lista faunística.

Es atraído por la luz artificial.

Nosotros lo hemos localizado solamente en dos ocasiones en la provincia de Albacete en Riópar, 16-VI-84 y Balneario de Tus, 3-VII-87. También existen ejemplares de esta especie capturados en Molinicos en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

*Ochodaeus montanus* Fuente, 1912

Endemismo ibérico descrito de Fuencaliente (Ciudad Real). Según López Colón (1986) en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales existen tres individuos de esta especie procedentes de Molinicos.