

Familia *APHODIIDAE**Aphodius (Agrilinus) constans* (Duftschmidt, 1885)

Especie muy escasa en la mitad meridional de la Península Ibérica.

Ha sido capturada en una ocasión en la provincia de Albacete en el Arroyo de la Celada el 1-XI-86 sobre excrementos de bovino.

Aphodius (Agrilinus) ibericus (Harold, 1874)

Elemento circunmediterráneo.

Especie muy rara, localizada en Peñascosa (10-IV-86) y La Segurana (13-IV-86) sobre excrementos de ovino.

Aphodius (Copriformus) scrutator (Herbst, 1789)

Especie común en la mitad norte peninsular, sus citas meridionales son muy escasas.

En la provincia de Albacete la hemos capturado en una ocasión en Peñascosa (7-V-83), sobre excrementos de bovino.

Aphodius (Plagiogonus) nanus (Fairmaire, 1860)

Especie ibero-norteafricana. Muy poco frecuente en la Península Ibérica y sólo en su mitad meridional.

La hemos encontrado en La Segurana (13-IV-86) bajo piedras; fue citada por BÁGUENA (1967) de Molinicos.

Rhyssemus algericus (Lucas, 1846)

Especie ibero-norteafricana. Muy escasa.

Fue citada por BÁGUENA (1967) de la provincia de Albacete sin especificar localidad. En la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid existen seis ejemplares de Molinicos.

Familia *MELOLONTHIDAE**Amphimallon korbi* (Reitter, 1894)

Endemismo de las sicras del sureste peninsular, Alcaraz y Segura, BÁGUENA (1967).

Fue descrita por Reitter sobre ejemplares de Molinicos. También ha sido citada en Riópar, El Pardal, Yeste y Chinchilla (BÁGUENA, 1967 y BARAUD, 1977). Nosotros la hemos encontrado en Riópar (7-VII-84) y Tus (24-VI-84).