

*Trimosternus cordatus* Rambur, 1837

Elemento bético.

La subespecie *sagrensis* Mateu 1952, descrita de la Sierra de La Sagra, se la ha citado también de la Sierra de Taibilla en la provincia de Albacete (JEANNE & ZABALLOS 1986).

La hemos capturado en la Cañada de los Mojones el 18-X-80 y 3-XI-85.

*Nepha ibericum* La Brûlerie, 1867

Especie de amplia distribución en las montañas de la Meseta (JEANNE & ZABALLOS, 1986). Paludícola y ripícola ha sido encontrada en la Cañada de los Mojones 23-IV-83 y 5-IV-88 lo que constituye la primera cita para la provincia.

*Panagaeus crux-major* (L., 1758)

Especie esporádica que vive en lugares húmedos. Ha sido capturada en Tus el 9-V-87 lo que constituye la primera cita para la provincia.

*Callistus lunatus* F., 1775

Vive en Europa central y mediterránea (JEANNEL, 1941). En España es más abundante en el norte siendo esporádica en el resto (JEANNE & ZABALLOS, 1986). La hemos capturado en la Sierra del Relumbrar el 4-VII-88.

*Lonchosternus hispanicus* Dejean, 1826

Es una especie rara cuya distribución es irregular y poco conocida. La hemos encontrado en la sierra del Relumbrar en las fechas siguientes: 4-VII-88, 20-VI-88 y 15-V-87. Esta especie se cita por primera vez en la provincia de Albacete.

*Penetretus rufipennis* Dejean, 1828

Según JEANNEL (1941) vive en el suroeste de Francia, Península Ibérica y Marruecos; habitando en regiones montañosas. La hemos capturado en la sierra del Relumbrar el 4-VII-88 y el 20-VI-88. Es la primera cita de esta especie en la provincia de Albacete.

*Edaphopausus favieri* Fairmaire, 1851

Elemento mediterráneo-occidental.

Se encuentra en los nidos de la hormiga *Pheidola pallidula* Nyl. Frecuente en las garrigas de la España mediterránea (JEANNE & ZABALLOS, 1986).

La hemos localizado en las siguientes localidades albacetenses: Puerto de las Crucetillas 4-V-87, Los Chorros (Riópar) 12-V-87 y 20-V-87, Hellín 12-IV-88, Peñascosa 4-III-87 y Laguna de Casas de Villora 12-IV-87.