


dispersión postgenerativa (sobre todo noviembre), datos que coinciden con otras zonas de España (Bernis, 1966-1971) (Gráfica 1). La cita de diciembre podría atribuirse a algún ejemplar sedentario que haya efectuado un pequeño desplazamiento debido a un invierno severo (del Hoyo y cols., 1992).



Gráfica 1. Distribución mensual de los registros de Avetoro Común, en los humedales de Albacete durante el periodo 1988-2011. En dos de los registros se desconoce el mes de la observación.

En general, fuera del periodo reproductor la especie es menos exigente con el hábitat y se puede encontrar prácticamente en cualquier masa de agua (Del Hoyo *et al.*, 1992). En cambio, en periodo de cría está confinado a carrizales extensos de zonas húmedas de agua dulce o poco salobre, y evita humedales demasiados ácidos o salados (Cramps y Simmons, 1977; Voisin, 1991; Tyler, 1994 y Tyler *et al.*, 1998). En España, los machos territoriales se pueden encontrar en humedales con vegetación variable según las zonas geográficas. Así, en La Mancha ocupa zonas dominadas por *Cladium mariscus* y *Schoenus nigricans* (Urdiales, 1992).

Disponemos de datos de observaciones de posibles aves reproductoras en los años 1989,1991, 1994, 1995 1998 y 2009 (Tabla 1), en cuatro humedales de la provincia (Mapa 1),

De todos los registros, únicamente, el de SAO (2001) confirma la reproducción en la Laguna de Los Ojos de Villaverde, humedal con grandes extensiones de carrizo, de *Cladium mariscus* y *Schoenus nigricans*, con