

## SECTOR A

Corresponde a la parte más septentrional del valle, la menos accidentada y por tanto altamente influenciada por el hombre a través del uso agropecuario del terreno. A menudo, el bosque de ribera se substituye por cultivo de chopos, álamos, huertas o zonas de pastoreo con incendios periódicos incentivadores del crecimiento de especies de interés pascícola.

### Localidades:

Partiendo desde El Picazo en la provincia de Cuenca y siguiendo el curso del río, llega hasta el término municipal de Albacete en su parte ribereña. Comprende localidades de los siguientes términos municipales: El Picazo, Rubielos Altos, Rubielos Bajos, Casasimarro, Sisante, Casas de Benítez, Villalgordo del Júcar, La Roda, Fuensanta, Tarazona de La Mancha, Montalvos, La Gineta, Madrigueras, Motilleja y Albacete.

### Bioclima:

Su bioclima es mesomediterráneo superior con algunos enclaves muy puntuales pertenecientes al supramediterráneo inferior ya terminal. El ombroclima oscila entre el seco medio y seco inferior (VALDÉS & HERRANZ, 1989).

### Biogeografía:

Distrito Albacetense (Subsector Manchego-Xucrense, Sector Manchego, Provincia Castellano-Maestrazo-Manchega) (ALCARAZ, F. & SÁNCHEZ, P., 1988).

## SECTOR B

A continuación del anterior, representa una zona de transición en cuanto a la accidentalidad del terreno, entre los sectores A y C. El Valle empieza a ser más profundo con cierta protección de las heladas y con nieblas duraderas en los meses de invierno y primavera. Estos factores contribuyen a posibilitar la aparición de algunos elementos termófilos, todavía escasos, mezclados con otros de la colindante llanura más fría y seca.

### Localidades:

Comprende el término de Valdeganga con localidades de muestreo tales como Valdeganga, Bolinches y Puente de Torres.

### Bioclima:

Mesomediterráneo, seco inferior (VALDÉS & HERRANZ, 1989).

### Biogeografía:

Igual a la del sector A.