

7. Sombrero peludo, cubierto de una capa de pelos, más evidente en el margen8
7. Sombrero glabro, sin pelos9
8. Látex abundante, que vira lentamente al secarse a tonos grisáceos. Carne extremadamente picante. Olor agradable, afrutado. Bajo encinas en suelos calizos *Lactarius mairei*
8. Látex abundante, rápidamente vira a amarillo intenso. Olor afrutado *Lactarius citriolens*
8. Látex escaso, inmutable. Olor fúngico no característico. Bajo jaras, en suelos silíceos *Lactarius tesquorum*
9. Látex blanco que vira a color amarillo al oxidarse10
9. Látex blanco, inmutable11
9. Látex blanco, que al oxidarse, a los pocos minutos, vira a colores violáceos. Sobre suelos silíceos, en jarales *Lactarius cistophilus*
10. Sombrero densamente marcado por numerosos hoyuelos. Viraje del látex lento y a veces poco evidente *Lactarius mediterraneensis*
10. Sombrero liso, sin hoyuelos, con zonaciones evidentes. Viraje del látex muy rápido, en menos de un minuto *Lactarius chrysorrhoeus*
11. Setas medianas, robustas, de entre 6 y 12 cm de diámetro, con sombrero zonado, color crema *Lactarius zonarius*
11. Setas pequeñas, de hasta 6 cm de diámetro, con sombrero de color uniforme, homogéneo, no zonado12
12. Pie con la base cubierta de un fieltro aterciopelado . . *Lactarius rufus*
12. Pie con la base glabra, sin pelo13
13. Seta uniformemente anaranjada *Lactarius mitissimus*
13. Seta de color marrón rojizo. Pie estriado bajo las láminas *Lactarius hepaticus*