

*dena* (*Anepia*) *perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775): [3], [6], [27]; 6.264 *Conisania* (*Luteohadena*) *andalusica* (Staudinger, 1859): [3], [4], [6], [19]; 6.265 *Leucania loreyi* (Duponchel, 1827): [4], [6], [19]; 6.267 *Leucania punctosa* (Treitschke, 1825): [6]; 6.268 *Leucania putrescens* (Hübner, [1824]): [6]; 6.270 *Mythimna riparia* (Boisduval, 1829): [6]; 6.271 *Mythimna albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775): [3], [4], [6]; 6.272 *Mythimna algerica* (Oberthür, 1918): [4], [27]; 6.273 *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787): [6], [12]; 6.274 *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767): [3], [6], [19]; 6.275 *Mythimna sicula* (Treitschke, 1835): [3], [6], [19]; 6.276 *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809): [6], [21], [27]; 6.277 *Mythimna vitellina* (Hübner, [1808]): [3], [4], [6], [19]; 6.278 *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775): [6], [27]; 6.279 *Orthosia cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775): [6], [20]; 6.280 *Orthosia gracilis* (Denis & Schiffermüller, 1775): [3], [6]; 6.281 *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766): [6], [27]; 6.282 *Panolis flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775): [4], [27]; 6.283 *Ochropleura leucogaster* (Freyer, 1831): [6]; 6.284 *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761): [3], [4], [6], [27]; 6.285 *Noctua comes* (Hübner, [1813]): [4], [6], [27]; 6.286 *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759): [4], [6], [27]; 6.288 *Noctua janthe* (Borkhausen, 1792): [6]; 6.289 *Noctua orbona* (Hufnagel, 1766): [19], [27]; 6.290 *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758): [19], [27]; 6.292 *Chersotis anatolica* (Draudt, 1936): [10]; 6.301 *Eugnorisma glareosa* (Esper, 1788): [4], [6], [27]; 6.302 *Xestia baja* (Denis & Schiffermüller, 1775): [10]; 6.303 *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758): [3], [6], [27]; 6.304 *Xestia kermesina* (Mabille, 1869): [4], [6]; 6.305 *Xestia xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775): [6]; 6.306 *Cerastis faceta* (Treitschke, 1835): [6]; 6.307 *Peridroma saucia* (Hübner, [1808]): [6], [19], [27]; 6.308 *Euxoa* (*Euxoa*) *aquilina* (Denis & Schiffermüller, 1775): Mu: [9]; 6.310 *Euxoa* (*Euxoa*) *cos* (Hübner, [1824]): Mu: [9]; 6.313 *Euxoa* (*Euxoa*) *obelisca* (Denis & Schiffermüller, 1775): [6]; 6.314 *Euxoa* (*Euxoa*) *temera* (Hübner, [1808]): [27]; 6.315 *Euxoa* (*Euxoa*) *tritici* (Linnaeus, 1761): [27]; 6.317 *Basistriga flammata* (Denis & Schiffermüller, 1775): [3], [4], [6], [19]; 6.320 *Dychagyris forcipula* (Denis & Schiffermüller, 1775): [6]; 6.322 *Cladocerotis optabilis* (Boisduval, 1829): [6]; 6.323 *Agrotis crassa* (Hübner, [1803]): [6], [27]; 6.324 *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758): [3], [4], [6], [19], [27]; 6.325 *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766): [6]; 6.327 *Agrotis lata* Treitschke, 1835: [6]; 6.328 *Agrotis obesa* (Boisduval, 1829): [6]; 6.329 *Agrotis puta* (Hübner, [1803]): [6], [19], [21], [27]; 6.330 *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775): [3], [6], [27]; 6.332 *Agrotis trux* (Hübner, [1824]): [21], [27].

6 b) ESPECIES CITADAS EN LA BIBLIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE, DE PRESENCIA DUDOSA EN LA ZONA DE ESTUDIO, Y CUYA IDENTIDAD TAXONÓMICA NO HA PODIDO SER CONTRASTADA

*Cucullia caninae* Rambur, 1833: Citada de la Peña del Gallinero – Riopar (ANDUJAR et al., 1986) [6].

*Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761): Citada del Campamento de San Juan – Riopar (ANDUJAR et al., 1986) [6].

*Caradrina kadenii* (Freyer, 1836): Citada de los alrededores de Riopar (AISTLEINER, U. & THÖNY, H., 1993) [3].