

(F. Palacios, 1974) poner un huevo al 25 por cien de las hembras, dos al 29,1 por cien, 3 al 37 por cien y 4 al 8,3 por cien.

Las medidas, según el mismo autor, de 2 huevos colocados ya en el oviducto, eran de 13 x 5,5 mm. y 10,9 x 6,1 mm.

Las hembras no son aptas para ovular y por supuesto para reproducirse, hasta que llegan a 3,8-3,9 cms. de longitud de cabeza y cuerpo.

**ALIMENTACION. COMPORTAMIENTO.**- Tanto la alimentación como la etología de *Algyriodes marchi* no han sido estudiados. Me limito, pues, a observaciones personales. La alimentación de esta lagartija es muy parecida a la de *Lacerta hispánica*, empleando las mismas técnicas de caza. Los animalillos que le sirven de alimento son tragados enteros, generalmente, por lo que tienen que limitar sus hábitos tróficos a presas de pequeño tamaño. Jorge Escudero (comunicación personal, 1979) las ha observado cazar, reiteradamente, moscas y mosquitos. La técnica empleada consistía en acechar, inmóviles, a las presuntas presas, observar atentamente sus movimientos, y una vez "puestas a tiro", a 10 ó 15 cms., saltar sobre ellas con certera rapidez.

Sus predadores habituales son *Sus scrofa*, *Vípera latastei*, *Coronella giróndica*, y, a veces, cuando coinciden el mismo biotopo, *Malpolon monspesulanus*.

Las he visto trepar por paredes de piedra, casi lisas, dando la impresión de que para ellas no existe la ley de la gravedad, tal es su soltura y ligereza. Con agilidad escudriña las grietas de las rocas o se introduce por las ranuras de árboles carcomidos, buscando alimento y ocultándose de sus enemigos. Es un animal muy tímido.

*LACERTA LEPIDA*. Daudin, 1802

**Lagarto ocelado, lagarto común.**

**DESCRIPCION E IDENTIFICACION:**

Es el mayor de los saurios españoles. Algunos ejemplares muy viejos nan llegado a medir hasta 90 cm. La cabeza, maciza y ancha, es grande en los machos y relativamente pequeña en las hembras. El hocico, fuerte y obtuso. La garganta y el vientre varía del blanco sucio al verde amarillento. La cola, larga y fuerte, es rojiza a veces, pero en general presenta un verde amarillento moteado de negro.

En la Península Ibérica hay dos formas diferenciadas de *Lacerta lepida*, encontrándose ambas formas en nuestra zona de estudio y superpo-