

- nema sp.
 2 Ortópteros: *Gryllus sp.*
 9 Himenópteros: *Apis mellifica*, *Anthidium sp.*
 1 Díptero: Asilido
 39 Coleópteros: Scarabeidae (*Onthophagus sp.*,
Scarabanus laticollis, *Scarabanus sacer*), Ten-
 nebriónidas (*Tentyria sp.*, *Micrositus sp.*,
Glabrasida strangulata), Coccinélidas (*Cocci-
 nella septempunctata*), Chrysomelidas (*Lep-
 tinotarsa decemlineata*, *Timarcha sp.*), Cara-
 bidas (*Harpalus sp.*, *Mylabris sp.*, *Amara sp.*),
 Alleculidas (*Heliotaurus ruficollis*), Miloidas
 (*Lagorina sericea*), Curculionidas (*Lixus sp.*)

Inscrito en el juego de la vida *Lacerta lepida* es a la vez cazador y cazado. Aunque la mayoría de cazadores mediterráneos preden alguna vez sobre él, es presa habitual de *Malpolon mospesulanus*, *Circaetus gallicus* y *Buteo buteo*.

REPRODUCCION.- A fines de abril o principios de mayo tiene lugar el celo. En esta época machos y hembras se visten con colores más fuertes y vivos para buscar su mutua atracción. Tras algunos acercamientos y preludios amorosos el fuerte y vigoroso Romeo muerde a su amada en el costado, sujetándola con terca tenacidad. Cuando consigue inmovilizarla se enlaza con ella buscando el acercamiento de las cloacas. Una vez superpuestas introduce uno de sus dos hemipenes consumando la cópula. Esta dura una media hora y suele repetirse una vez al día durante varias jornadas consecutivas.

La puesta tiene lugar a finales de mayo o principios de junio y es colocado en cavidades y grietas de árboles. Consta de unos 17 ó 18 huevos normalmente, aunque puede oscilar entre 6 y 23. Estos son grandes, ovales y alargados.

En agosto o septiembre nacen los jóvenes que visten su librea característica, verde olivácea salpicada de ocelos blancos de borde oscuro.

COMPORTAMIENTO Y COSTUMBRES.- Es un lagarto muy activo encontrándosele casi siempre en actitud vigilante. Su actividad mayor coincide con las horas de más calor en el día, es decir entre 9 y 16 horas. Muy ágil y rápido, trepa con asombrosa ligereza a los árboles, ocultándose en