

Linaria bipunctata (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) subsp. **bi-punctata**

Linaria filifolia Lag., Gen. Sp. Nov.: 19 (1816)

Delicada hierba anual perteneciente a la familia *Scrophulariaceae*, que en la zona donde la hemos encontrado crece sobre arenas y rara vez sobrepasa los 25 cm de altura. Es una planta endémica de la Península Ibérica, que se distribuye por el E de Portugal y por la zona C y W de la España peninsular (SÁEZ, com. pers.).

Además de constituir nueva cita para la provincia de Albacete, su localización en el NE provincial representa la localidad más al SE de la que tenemos noticia hasta ahora en la Península Ibérica. Las referencias más próximas que conocemos corresponden a la provincia de Cuenca (cf. ARÁN & MATEO, 1999: 35 y PINILLOS, 2000: 393).

Debido a la reducida superficie donde crece, y a que lo hace en el interior y alrededores de una cantera de extracción de arena, aunque ésta permanece inactiva en los últimos años, debería controlarse periódicamente el estado de conservación de su hábitat, pues de retomarse la actividad extractiva, esta planta podría desaparecer.

ALBACETE: 30SXJ4248, 685 m, Alborea, arenero del Cerro Cuchillo. Pastizal en arenero y viña contigua. *J. Gómez*, 9-7-98 (J. GÓMEZ 35). **Ibidem**, 680 m, Alborea, arenero del Cerro Cuchillo. Pastizal en arenero. *J. Gómez*, 10-4-99 (J. GÓMEZ 161). **Ibidem**, 690 m, Alborea, Arenero del Cerro Cuchillo. Pastizal sobre arenas desnudas. *J. Gómez*, 28-4-02 (J. GÓMEZ 1159). **Ibidem**, 690 m, Alborea, Arenero del Cerro Cuchillo. Pastizal sobre arenas desnudas. *J. Gómez*, 2-6-02 (MA 729110, ALBA 6485, J. GÓMEZ 1268).

ARÁN, V. J. & G. MATEO (1999); PINILLOS, J. A. (2000); SUTTON, D. A. (1998); VIANO, J. (1978); VIANO, J. (1979).

<http://www.anthos.es>

http://www.rjb.csic.es/floraiberica/floraiberica/texto/imprenta/vol_XIII/entrega-4/Linaria.pdf