

mitad oriental de la península Ibérica. Las plantas nutricias que dan ANDÚJAR y GÓMEZ (1985) para la especie son erróneas, ya que en los alrededores de Madrid, y parece que en general en toda su área de reparto se alimenta de la Dipsacacea *Cephalaria leucantha*, citada en la zona por HERRANZ et al. (1986). Se encuentra citada de 3 cuadrículas.

#### SATYRIDAE

*Melanargia occitanica*: también sólo citada como indeterminada por HEATH (1981). Se ha citado de una cuadrícula, aunque como en el caso de *M. ines*, puede haber pasado desapercibida entre la gran cantidad de individuos de su congénere *M. lachesis*.

#### ARCTIIDAE

*Ocnogyna zoraida*: considerado por VIEDMA y GÓMEZ-BUSTILLO (1985) un endemismo se puede asimilar a esta categoría de indeterminados, dado que continuamente van apareciendo en la bibliografía nuevas zonas de reparto para la especie. Está citada de una cuadrícula.

#### ZYGAENIDAE

*Zygaena nevadensis*: calificada por VIEDMA y GÓMEZ-BUSTILLO (1985) como rara, está citada en una cuadrícula.

*Zygaena ignifera*: que aunque está calificado como en peligro por VIEDMA y GÓMEZ-BUSTILLO (1985), dado los escasos conocimientos que hay de su distribución podía incluirse en esta categoría. Se encuentra citada de dos cuadrículas.

#### ESPECIES VULNERABLES

En esta categoría se encuentran dos especies, ambas de la familia Nymphalidae:

*Melitaea deione*: sólo citada por HEATH (1981), su situación dentro de la península parece asimilable a la categoría anterior. Se encuentra citada de 4 cuadrículas.

*Brenthis hecate*: igualmente sólo citada por HEATH (1981), su situación dentro de la península no parece especialmente preocupante. Está citada de cinco cuadrículas, y es una especie abundante por la zona.