

Lactarius vinosus Quélet

=*L. sanguifluus* (Paulet:Fr.) var. *vinosus* Quélet.

Guískano, guískano borracho

Descripción: setas que se desarrollan solitarias o en grupos de dos o tres ejemplares unidos por el pie. Sombrero de 5 a 12 cm de diámetro, aplanado o ligeramente embudado, claramente zonado en bandas concéntricas, de color naranja intenso. Láminas adnatas o levemente decurrentes, de color rojizo. Pie corto, de longitud claramente inferior al diámetro del sombrero, hueco, con hoyitos en su superficie. Látex morado, de apariencia similar al vino tinto.

Ecología: especie característica de pinares. Escaso en nuestra provincia. Según nuestras observaciones de campo, crece en pinares sobre suelos síliceos, como los pinares de *Pinus pinaster* del entorno del campamento de San Juan en Riópar.

Observaciones: su nombre popular, tanto el que citamos como el de "mizclo borracho" que recibe en Cuenca, se deben al color característico de su látex.

Especies de látex transparente

Estas especies se caracterizan por su látex transparente, de aspecto acuoso, lo que dificulta en ocasiones su apreciación.

Lactarius atlanticus Bon

Descripción: sombrero aplanado, de 4 a 10 cm de diámetro. Láminas adnatas o ligeramente decurrentes. Pie alargado, en la base presenta un fieltro característico. Toda la seta presenta un color anaranjado intenso, sin zonaciones. Látex transparente, acuoso.

Ecología: especie ligada a las encinas (*Quercus rotundifolia*) con las que establece micorrizas. Es frecuente en toda la provincia. Citado en la Sierra de Alcaraz por Pérez-De-Gregorio y Rodríguez (com. pers.).

Observaciones: a pesar de su nombre científico, se trata de un hongo mediterráneo, propio de las formaciones esclerófilas climácicas del área circunmediterránea.