

Tabla 1: Tabla fitosociológica efectuada con los inventarios levantados en la localidad de estudio.

| NºINVENT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ALTITUD | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| EXPOSICION | T.V |
| PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COBERTURA (%) | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 60 | 65 | 50 | 40 | 90 |
| SUPERFICIE (m ²) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Características de *Quercetalia ilecis*:

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| <i>Quercus ilex</i> | | | | | | | | | | | | | |
| subsp. <i>rotundifolia</i> | 1.1 | +1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | +1 | +1 | +1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
| <i>Rhamnus lycioides</i> | +1 | +1 | | +1 | +1 | +1 | | +1 | +1 | +1 | +1 | | +1 |
| <i>Asparagus acutifolius</i> | +1 | +1 | +1 | | +1 | +1 | +1 | | | +1 | | +1 | |
| <i>Daphne gnidium</i> | | | | | | | +1 | | +1 | +1 | | +1 | |

Características de *Rosmarino-Ericion*:

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| <i>Helianthemum pilosum</i> | 1.1 | 1.1 | +1 | 1.1 | +1 | | +1 | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| <i>Cistus clusii</i> | +1 | +1 | | +1 | +1 | | +1 | +1 | +1 | +1 | | | |
| <i>Convolvulus lanuginosus</i> | +1 | | | +1 | +1 | +1 | | | +1 | | | | +1 |
| <i>Stachelia dubia</i> | | | | 1.1 | +2 | | | | | +2 | +1 | | +1 |
| <i>Stipa offneri</i> | | | | | | | +1 | | +1 | +1 | | | 1.1 |

Características de *Rosmarinetalia*:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| <i>Teucrium polium</i> | 2.2 | 2.2 | +1 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | +1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | |
| subsp. <i>capitatum</i> | | | | | | | | | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| <i>Leuzea conifera</i> | +1 | +1 | 1.1 | +1 | +1 | 1.1 | +1 | | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| <i>Argyrolobium zanonii</i> | +1 | | | +1 | | | | | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| <i>Koeleria vallesiana</i> | | | | | | | | | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| <i>Fumana eriocephex</i> | | | | | | | | | +1 | 1.1 | +1 | | |
| <i>Genista scorpius</i> | | | | +1 | | | | | +1 | | +1 | | +1 |
| <i>Stipa tenacissima</i> | | | | | 1.2 | | | | | | +1 | 2.2 | |
| <i>Thymus zygis</i> | | | | | | | 1.1 | | | | +1 | | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | | | | | | | | | | | +1 | | |
| <i>Atractylis humilis</i> | | | | | | | | | | | +1 | | |
| <i>Ophrys lutea</i> | | | +1 | | | | | | | | | | |

Características de *Thero-Brachypodietea*:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| <i>Sanguisorba minor</i> | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| <i>Clypeola jonthlaspi</i> | +1 | +1 | | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| <i>Hippocratea bourgaei</i> | +1 | +1 | | +1 | +1 | | | | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| <i>Medicago minima</i> | +1 | | +1 | | | | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| <i>Filago pyramidalata</i> | +1 | +1 | | +2 | +1 | | | +1 | | +1 | | | |
| <i>Teucrium pseudochamaepitys</i> | +1 | | | | | +1 | | | | +2 | 1.1 | 1.1 | |
| <i>Helianthemum salicifolium</i> | +1 | +1 | | +1 | +1 | | | | | | | | |
| <i>Phlomis lychnitis</i> | | | | +1 | | | | +1 | | | | +1 | |
| <i>Paronychia capitata</i> | | | | | +1 | | | | +1 | | | +1 | |
| <i>Leontodon taraxacoides</i> | | +1 | +1 | | | +1 | | | | | | | |
| <i>Euphorbia exigua</i> | +1 | | | | | | | | +1 | +1 | | | |
| <i>Polygala monspeliaca</i> | | | | | +1 | | | | | +1 | | | |
| <i>Lithospermum arvense</i> | | | | | | | | +1 | +1 | | | | |
| <i>Paronychia argentea</i> | | | +1 | | | | | | | | | | |
| <i>Hornungia petraea</i> | | | +1 | | | | | | | | | | |