

El Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) es una rapaz nidificante en el Paleártico occidental (Del Hoyo, Elliot y Sargatal, 1994), que en España se distribuye fundamentalmente en las Marismas del Guadalquivir y cuencas de los ríos Ebro, Duero y Tajo-Mancha Húmeda (Jubete, 2003).

En Castilla-La Mancha se reproduce en las cinco provincias, con su área de distribución de mayor entidad localizada en Toledo y Ciudad Real y, en menor medida, en la mitad norte de Albacete, sudoeste de Guadalajara y oeste de Cuenca.

En Albacete nidifica fundamentalmente en los humedales del Campo de Montiel (Lagunas de Ruidera, Salinas de Pinilla, Laguna de El Arquillo y Ojos de Villaverde), Laguna de Tinajeros y Corredor de Almansa, en el Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera (Molina y Martínez, 2008; Picazo, 2000 a 2010).

El hábitat de la especie en España, Castilla-La Mancha y Albacete son los humedales provistos de vegetación palustre de porte medio o alto, donde nidifica (SAO, 2001; Jubete, 2003; López de Carrión y cols, 2005) y ubica sus mayores dormitorios (García, 2002). También ocupa espacios abiertos de cultivos cerealistas para alimentarse y nidificar (SAO, 2001; Jubete, 2003; López de Carrión y cols, 2005; Molina y Martínez, 2008).

El objetivo del presente estudio es conocer la población reproductora del Aguilucho Lagunero Occidental y su distribución en los humedales del Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera durante el año 2011 (Figura 1), así como describir la evolución experimentada por esta población en lo largo de la última década. Para mayor información sobre la zona, véase, por ejemplo, en Romero y Ruiz (1986), Herreros (1987 y 1992), Cirujano y cols (1988) y López y cols (2004).

Para la realización de los censos seguimos la metodología recomendada por Molina y Martínez (2008), exceptuando la tercera visita que proponen para obtener información de los parámetros reproductores, por no ser objetivo de nuestro estudio. Así pues, realizamos 2 visitas a la totalidad de humedales del citado Complejo lagunar, al inicio del periodo reproductor de la especie, durante la construcción de los nidos y con posterioridad al nacimiento de los pollos (según se estimó en la Laguna de Salobrejo, que fue visitada y prospectada de una forma más exhaustiva con motivo de otro trabajo).

Las categorías de reproducción consideradas fueron las siguientes (Molina y Martínez, 2008):

1. Nidificación Segura: Se observa a la hembra transportando material a nido; se encuentra un nido con huevos o pollos; se observa a un adulto llevando presas a los pollos; o se observan pollos volantes.