

Familia Noctuidae, Subfamilia Catocalinae

Autophila dilucida (Hübner, 1808)

Recogemos dos citas publicadas por **Pérez Fernández et al. (2012)** como especie troglófila.

Año 1995: un ejemplar el 5 de febrero en el interior de la cueva del Farallón (Riópar).

Año 2010: un ejemplar el 8 de agosto en el interior de la cueva de Los Chorros (Riópar).

Apopetes spectrum (Esper, 1787)

Recogemos dos citas publicadas por **Pérez Fernández et al. (2012)** como especie troglófila.

Año 1995: un ejemplar en el interior de la cueva del Farallón (Riópar) el 5 de febrero.

Año 2010: un ejemplar en la cueva del Farallón (Riópar), el 22 de agosto.

Familia Noctuidae, Subfamilia Hadeninae

Mormo maura (Linnaeus, 1758)

Año 2010: un ejemplar en el interior de la cueva de Los Chorros (Riópar) el 8 de agosto. Publicado por **Pérez Fernández et al. (2012)** como especie troglófila.

Familia Noctuidae, Subfamilia Noctuinae

Lycophotia erythrina (Herrich-Schäffer, 1852)

Nueva especie para la provincia.

Año 2018: un macho el 29 de septiembre en el arroyo de La Celada (Molinicos). **Arcas et al. (2019)**.

Xestia agathina (Duponchel, 1928)

Nueva especie para la provincia.

Año 2018: un macho el 29 de septiembre y otro el 12 de octubre, ambos en el arroyo de La Celada (Molinicos). **Arcas et al. (2019)**.