

## Orden HYMENOPTERA

**García y Tinaut (2017)** publican los resultados de un muestreo de hormigas realizado entre mayo y agosto de 2016 en la Reserva de Fauna Hazardillas y Era Vieja, adyacente al Parque Natural de las Lagunas de Ruideira. Este trabajo supone la ampliación de la fauna mirmecológica (familia Formicidae) conocida en la provincia de Albacete de 14 a 36 especies. Se enumeran a continuación las 22 nuevas especies para la provincia obtenidas en dicho trabajo:

### Familia Formicidae, subfamilia Dolichoderinae

*Tapinoma nigerrimum* complex. Se han obtenido ejemplares de tres especies que han estado confundidas con *T. nigerrimum* (Nylander, 1856): *T. magnum* Mayr, 1861; *T. ibericum* Santschi, 1925 y *T. darioi* Seifert, D'Eustacchio, Kaufmann, Centorame, Lorite & Modica, 2017. Los autores prefieren dejar la adscripción taxonómica al complejo de especies *T. nigerrimum* mientras se hace un análisis más detallado de las muestras obtenidas.

### Familia Formicidae, subfamilia Formicinae

*Camponotus cruentatus* (Latreille, 1802)

*Camponotus lateralis* (Olivier, 1792)

*Camponotus piceus* (Leach, 1825)

*Camponotus pilicornis* (Roger, 1859)

*Cataglyphis iberica* (Emery, 1906)

*Formica decipiens* Bondroit, 1918

*Iberoformica subrufa* Roger, 1859

*Plagiolepis pygmaea* (Latreille, 1798)

*Plagiolepis schmitzii* Forel, 1895

### Familia Formicidae, subfamilia Myrmicinae

*Aphaenogaster dulciniae* Emery, 1924

*Crematogaster sordidula* (Nylander, 1849)