

Orden PHOENICOPTERIFORMES

Familia Phoenicopteridae

Flamenco común

Phoenicopus roseus Pallas, 1811

Reproducción de la especie en la laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) y otras citas fuera del complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera.

Año 2019: Se estiman 400 parejas reproductoras y 18 pollos nacidos, de los que volaron 13 (**Juan Picazo**); 108 adultos en la nava de los Melchores (El Bonillo), el 7 de mayo (**José Antonio Cañizares**); 96 en la nava de los Melchores II (El Bonillo), el 18 de mayo (**Julia Giménez y Siro González**); 35 en la nava de Peribáñez (El Balletero), el 18 de mayo (**Julia Giménez y Siro González**).

Flamenco enano

Phoeniconaias minor (Geoffroy Saint-Hilaire, 1798)

Especie subsahariana. Las citas en diferentes países europeos suelen ser escapes de ejemplares cautivos en colecciones zoológicas. Sin embargo los avistamientos en España, habitualmente dentro de bandos de flamenco común, probablemente se traten de ejemplares divagantes desde sus poblaciones africanas.

Año 2019: 2 ejemplares adultos el 22 de mayo en la laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) (**Antonio Fajardo y Julián Picazo**, cita publicada en Molina *et al.* 2020).

Orden CICONIIFORMES

Familia Ciconiidae

Cigüeña negra

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Año 2019: 1 ave en el río Júcar en Bolinches (Valdeganga), el día 7 de mayo (**Juan Fresneda**); 1 en Villarrobledo, el 20 de septiembre (**Myriam Mondéjar**).