

It is suggested that the presence and reproduction of the Marbled Teal in the wetlands of eastern Albacete is likely to be directly influenced and related to the proximity of wetlands in the south of Alicante.

Key words: Marbled Teal, Albacete.

La Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*) es un pato de distribución Paleártica fragmentada (Green, 1993, Navarro y Robledano, 1995), cuyos efectivos reproductores en España son muy reducidos y con amplias fluctuaciones anuales (30-200 parejas; Green, Echevarrías y Fernández, 2004; Ballesteros y cols, 2008). Cría habitualmente en dos núcleos principales, las Marismas del Guadalquivir y los humedales sudallicantinos, de forma más escasa en otras localidades de Almería y Valencia, y ocasionalmente en zonas de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (Green, 1993; Navarro y Robledano, 1995; Green y Navarro, 1997; Ballesteros y cols, 2008).

Su población invernante en España es muy escasa y está muy concentrada en pocas localidades (González y Pérez-Aranda, 2011).

El objetivo del estudio es reunir datos de presencia de esta especie catalogada *En Peligro de Extinción* (tanto en España como en Castilla-La Mancha), en los humedales de la provincia de Albacete, para lo cual se recurrió a la consulta bibliográfica y a la petición de información inédita a través de Internet, especialmente dirigida a los ornitólogos locales de la Sociedad Albacetense de Ornitología.

Aunque no dispusimos de censos específicos para la especie en los humedales albacetenses, si consideramos los censos invernales y primaverales de aves acuáticas durante los periodos 1988-2011 y 2000-2011, respectivamente (véase, por ejemplo, en Picazo, 2011a y b), que tienen un carácter sistemático y periódico.

Para mayor información sobre los humedales provinciales puede consultarse, por ejemplo, en Romero y Ruiz (1986), Herreros (1987 y 1992), Cirujano y cols (1988), Cirujano (1990), Alonso y De la Torre (2004) y López y cols (2004).

Se recopilan 28 citas correspondientes al periodo 1988-2011 (Tabla 1), con una Media de 4,4 aves/registro (entre 1 y 16 aves/registro).