

Laguna de los Patos

13-9-89. Atropellada.

La Gila

24-5-92. Muda incompleta.

Las Mariquillas

28-9-87. Individuo adulto localizado en el interior de un aljibe.

Los Llanos

30-6-87. Atropellada en la carretera.

Puente de Mahora

17-6-89. Atropellada.

| <u>MES</u> | <u>OBSERVACIONES</u> |
|----------------------|----------------------|
| Enero | — |
| Febrero | — |
| Marzo | — |
| Abril | — |
| Mayo | 4 |
| Junio | 2 |
| Julio | — |
| Agosto | — |
| Septiembre | 6 |
| Octubre | — |
| Noviembre | — |
| Diciembre | — |

13. CULEBRA DE COLLAR *Natrix natrix*

Culebra mediana a grande, con escamas carenadas en 19 hileras en la mitad del cuerpo. Diseño uniforme grisáceo u oscuro, con un moteado negro. La subespecie ibérica (*N. n. astreptophora*) presenta el iris rojo. Los juveniles presentan un «collar» amarillento bordeado de negro, que se pierde en los adultos. Normalmente ligada al agua. Habita la mayor parte de Europa (Arnold y Burton, 1982). Citada en la Laguna Ojos de Villaverde (González et al. 1991) y Río Segura (Ruiz et al. 1989). Aportamos cuatro observaciones en cuatro localidades nuevas. La escasez de observaciones de esta especie nos impide hacer un análisis fenológico.

El Arquillo

1-5-85. Ejemplar muerto junto a la Laguna Grande. 35 cm.