

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*): Familia *Motacillidae*, orden *Passeriformes*. Considerada un ave de carácter estival en la Península y Baleares, donde cría en pastos húmedos, marismas, canales de riego y saladares, quedando restringida en su distribución a lugares en donde aparezca este tipo de ambientes (Tellería et al. 1999).

La migración otoñal la realiza en grupos, atravesando la Península de forma rápida, invernando principalmente en África occidental y tropical, desde Senegal hasta Chad, con algunas citas de invernada en Marruecos y Andalucía. Se han recuperado 79 aves anilladas en Bélgica, 77 en Alemania, 30 en Inglaterra, 28 en Suecia, 12 en Holanda, 5 en Francia, 3 en Chequia, 2 en Polonia, 2 en Dinamarca y 1 en Finlandia (Tellería et al. 1999).

En nuestra provincia, disponemos de 45 capturas para anillamiento, entre abril y octubre (máximos en abril), se trata de citas en ambos pasos migratorios con la excepción de algunas capturas a lo largo de julio y agosto en la Laguna de Pétrola (Pétrola), que indican la reproducción de esta lavandera en la citada laguna (datos propios).

Para este estudio, la única captura se realizó a primeros de octubre (semana 10), tratándose de un ave joven (edad 3) y sexo indeterminado.




Figura 20. Capturas de Lavandera Boyera (*Motacilla flava*):
Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

La biometría tomada para esta lavandera resultó: **Ala** = 81.5 mm; **Tarso** = 23.2 mm y **Peso** = 22.5 grms. El valor de grasa presente en este ejemplar, fue de 3.