

Acentor Común (*Prunella modularis*): Familia *Prunellidae*, orden *Passeriformes*. Ocupa los medios arbustivos de la mitad norte peninsular, resultando abundante en la región Eurosiberiana y en sectores subcantábricos, tiende a rarefarse en las zonas más xéricas de la región Mediterránea (Tellería et al. 1999).

Durante el invierno (septiembre-marzo) coloniza las costas atlánticas y los pisos meso y termomediterráneo (zonas más térmicas), recibiendo notables aportes de individuos invernantes europeos: 40 recuperaciones de aves anilladas en Alemania, 11 en Francia, 11 en Suiza, 10 en Suecia, 7 en Bélgica, 3 en Noruega, 2 en Finlandia, 2 en Polonia, 1 en los Países Bálticos, 1 en la antigua Checoslovaquia, 1 en Dinamarca y 1 en Italia (Tellería et al. 1999).

En la provincia de Albacete, disponemos de 88 capturas, que se distribuyen entre octubre y marzo, alcanzando su máximo en noviembre (datos propios). La recaptura en inviernos posteriores de individuos anillados en el mismo lugar, avala una cierta filopatría a los lugares de invernada.

Mientras duró el trabajo de campo, solamente se logró la captura de un joven (edad 3) de esta especie en el último periodo (24-30 octubre).




Figura 21. Capturas de Acentor Común (*Prunella modularis*):

Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Este ejemplar, presentó las siguientes medidas: **Ala** = 70 mm; **Tarso** = 21.2 mm y **Peso** = 20.5 grms. El nivel de grasa obtenido en este individuo, se situó en 3.