


**Ruiseñor Común** (*Luscinia megarhynchos*): Familia *Turdidae*, orden *Passeriformes*. Especie netamente estival, que se distribuye por toda la región Mediterránea, donde solo falta en los pisos de montaña y escasea en la región Eurosiberiana (Tellería et al, 1999).

Este migrante transahariano, llega a la Península a partir de marzo, abandonándola entre agosto y octubre, al parecer antes los jóvenes que los adultos. Las recuperaciones de aves extraibéricas, se obtienen fundamentalmente en el oeste peninsular y proceden de Alemania (8), Bélgica (4), Francia (4) e Inglaterra (2) (Tellería et al, 1999).

A la provincia de Albacete, llegan entre finales de marzo y primeros de abril, abandonando sus lugares de cría entre julio y agosto (observaciones propias). A lo largo de septiembre e incluso a principios de octubre, todavía se citan algunos individuos, pero muy probablemente sean aves foráneas en paso (datos propios). De muy fuerte se puede catalogar la filopatría que muestra esta especie por sus lugares de cría, regresando año tras año invariablemente al mismo lugar de cría. Existe una cita tardía el 22 de noviembre de 1998 en Sotuelamos (El Bonillo) (López et al. 1999).

Un solo individuo durante este trabajo, su captura se produjo en el periodo I (1-7 agosto) y se trató de un ave joven (edad 3) y sexo indeterminado, con un alto nivel de grasa acumulado.



**Figura 22.** Capturas de Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*): Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

La biometría obtenida para este ruiseñor fue la siguiente: **Ala** = 78.5 mm; **Tarso** = 25.9 mm y **Peso** = 20 grms.

Su grasa se estimó en 4.