


bre y primeros días de octubre. Solo existe la recuperación de un ave anillada en el sur de Francia (Cantos, 1992; Tellería et al. 1999).

También en la provincia de Albacete se muestra como una especie bastante escasa, con solo 4 capturas hasta la fecha, dos en junio (Laguna Cenagosa/Ruidera y Laguna de Tinajeros/Albacete) y dos en agosto (Charcón del Encinar/Albacete). Además de las dos capturas plenamente estivales de junio, durante el verano, también hemos oído su reclamo en las Lagunas de Ojos de Villaverde (Robledo) y Los Patos (Hellín), así como en las márgenes del río Jardín (El Jardín), lo que podría implicar posible reproducción en estos parajes (datos propios).

En el presente estudio, solamente se capturó 2 veces y en la misma jornada (periodo 3), siendo ambos individuos del año (edad '3') y sexo indeterminado.



**Figura 30.** Capturas de Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*): Barras = nº absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Las dos aves capturadas, presentaron la siguiente biometría: **Ala** = 68-71,5mm, media 69,7 (n=2); **Tarso** = 20,1-22,1 mm, media 21,1 (n=2); **Peso** = 14-16 grms, media 15 (n=2). La grasa acumulada para estos dos individuos, estuvo en niveles 3 y 5.