

| Género y especie | WH | WH | WH | WH |
|---|----|----|----|----|
| | 45 | 46 | 55 | 56 |
| <i>Dendrolimus pini</i> (L., 1758) | . | . | + | × |
| <i>Eriogaster rimicola</i> (D. & Schiff., 1775) | . | . | + | . |
| <i>Macrothylacia digamma</i> (Melade-Waldo, 1905) | . | . | . | □ |
| <i>Macrothylacia rubi</i> (L., 1758) | . | + | . | . |
| <i>Malacosoma neustria</i> (L., 1758) | . | . | . | . |
| <i>Phyllodesmia suberifolia</i> (Duponchel, 1842) | . | . | + | . |
| <i>Trichiura castiliana</i> Spuler, 1908 | + | . | . | . |

n.º de spp. por cuadrícula 2 1 3 4

Número total de especies: 7.

Tabla 2d. Lista y distribución de los Lasiocampidae de las Sierras de Alcaraz y Calar del Mundo.

+: citas de la bibliografía

×: citas de la bibliografía confirmadas con capturas

□: nuevas citas

| Género y especie | WH | WH | WH | WH |
|--|----|----|----|----|
| | 45 | 46 | 55 | 56 |
| <i>Euproctis chrysorrhoea</i> (L., 1758) | + | . | . | . |
| <i>Ocnaria rubea</i> (F., 1787) | . | . | + | . |
| <i>Porthetria dispar</i> (L., 1758) | . | . | + | . |

n.º de spp. por cuadrícula 1 — 2 —

Número total de especies: 3.

Tabla 2e. Lista y distribución de los Lymantridae de las Sierras de Alcaraz y Calar del Mundo.

+: citas de la bibliografía

×: citas de la bibliografía confirmadas con capturas

□: nuevas citas