

Medidas:

	D	O	O/D
FA-60(29)	25	6	0.24

Diagnosis: Tamaño pequeño y región ventral estrecha. Costulación debilitada, sin tubérculos y con escaso relieve en la región ventral. Borde umbilical redondeado.

Descripción: Tamaño máximo observado de 25mm, con involución en torno al 25%. Sección ovalada de flancos ligeramente convexos. Costulación variable pero poco marcada. Borde umbilical redondeado en ocasiones. Peristoma desprovisto de visera y con rama dorsal perpendicular.

Discusión y afinidades: Especie similar a *G. (L.) lingulatum* QUENSTEDT, aunque sin canal lateral; las costillas no suelen alcanzar el final de la cámara de habitación. Los flancos son más convexos.

Distribución geográfica: Perfil de Fuente Alamo.

Distribución estratigráfica: En la Cordillera Ibérica se ha reconocido en la Zona Planula. En el Prebético Central ha sido citada en la Zona Planula y en el Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). Los ejemplares estudiados pertenecen al Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota).

### Subgénero *G. (Coryceras)* ZIEGLER, 1958

Especie tipo: *Ammonites microdomus* OPPEL, 1856-58.

### *Glochiceras (Coryceras) modestiforme* (OPPEL)

Sinonimia:

- 1863 *Ammonites modestiformis* OPPEL, p.192, lám.54/fig.5.
- 1958 *Glochiceras (Coryceras) modestiforme* (OPPEL) in ZIEGLER, p.125 lám.11/figs.19-27.
- 1984 *Glochiceras (Coryceras) modestiforme* (OPPEL) in SCHAIRER, p.28, lám.1/figs.1-9.

Material: 2 ejemplares.

Medidas:

	D	O	O/D
FA-53(29)	11.35	3.5	0.30