

**Corología:** Regiones templadas del Hemisferio Norte. Es habitual en la mitad septentrional peninsular, haciéndose más rara hacia el sur. Como la anterior, su distribución se limita a zonas próximas a Riópar (**Figura 45**).

**Usos:** Antihelmíntica.

***Dryopteris submontana* (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins in Candollea 32: 311 (1977)**

*Dryopteris villarii* subsp. *submontana* Fraser-Jenkins & Jermy in Fern Gaz. 11: 339 (1977) [basión.]

*Dryopteris villarii* subsp. *pallida* auct.

*Dryopteris villarsii* auct.

*Polistichum rigidum* auct.

**Familia:** DRYOPTERIDACEAE

**Nombres comunes:** Desconocidos.

**Descripción (Figura 48):** Rizoma: corto, robusto, oblicuo y paleáceo. Frondes: de hasta 70 cm, no persistentes en invierno, fasciculadas. Pecíolo: de 1/3 a 2/3 la longitud de la lámina, glanduloso y paleáceo. Páleas ovado-lanceoladas, castaño pálidas. Lámina: bipinnada, estrechamente triangular-lanceolada, herbácea, verde oscura, mate, densamente cubierto de glándulas que desprenden un intenso olor a limón. Pinnas: simétricas. Pínnulas: ovado-lanceoladas, con ápices agudos, lóbulos rectangulares y dientes grandes, estrechamente agudos y rectos. Soros: Indusio reniforme, delgado, gris verdoso, glanduloso y persistente. Esporas: elípticas, de 34 a 42 µm. Esporulación: de junio a octubre.

**Ecología y biotipo:** Habita entre las grietas de las rocas calizas y en ambientes umbrosos. 1000-2300 m. Hemicriptófito.

**Corología:** Presente en el sur y oeste de Europa y en los márgenes del Mar Mediterráneo (norte de África, Turquía y Cáucaso). Sobre la Península se desarrolla en el sistema pirenaico-cantábrico y las sierras béticas. Es una especie muy rara en la provincia de Albacete, con un área restringida a las zonas de Riópar y Paterna de Madera (**Figura 47**).

***Equisetum arvense* L., Sp. Pl.: 1061 (1753)**

**Familia:** EQUISETACEAE

**Nombres comunes:** Cola de caballo menor, cola de ratón, equiseto menor, hierba estañera.