

## DATOS DE LOS CARABIDAE COLECTADOS EN LAS LAGUNAS Y EMBALSES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

### Tribu **Cicindelini**

*Megacephala (Graumognatha) euphratica* Dejean, 1822

Elemento mediterráneo meridional. Especie halobia. Saladar de Cordovilla.

*Cephalota (Cassolaia) maura* (Linnaeus, 1758)

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila que vive en zonas salobres, márgenes de ríos, arroyos y ramblas, colectada en mayo y agosto. Lagunas de Corralrubio, Horna, Pétrola, Salobrelejo, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

*Cephalota (Taenidia) circumdata imperialis* Klug, 1834

Elemento mediterráneo septentrional. Especie halobia. Salinas de Pinilla.

*Cicindela (Calomera) littoralis littoralis* Fabricius, 1787

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila, se localiza en enclaves salinos y en la orilla de lagunas interiores y cursos de agua; marzo a diciembre. Lagunas de Casas De VÍllora, Corralrubio, Horna, Pétrola, Saladar, Salobrelejo, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

*Cicindela (Cicindela) campestris campestris* Linnaeus, 1758

Elemento paleártico. Especie higrófila, vive en bosques, campos y es frecuente observarla en laderas, caminos y terrenos despejados; febrero a junio y en septiembre. Lagunas de Arquillo, Ojos de Villaverde y Pétrola, Saladar de Cordovilla.

*Cicindela (Cicindela) maroccana pseudomaroccana* Roeschke, 1891

Elemento bético rifeño. Especie de tendencias orófilas; febrero a mayo, en terrenos con mayor contenido salino que la especie anterior. Embalses de Taibilla y Talave, Saladar de Cordovilla.

*Cicindela (Cylindera) paludosa* (Dufour, 1820)

Elemento mediterráneo occidental. Especie halofila presente preferentemente en enclaves palustres; abril hasta septiembre, más abundante en verano. Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.