

**Phelipanche rosmarina** (Beck) Banfi, Galasso & Soldano in Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 146(2): 235 (2005)

*Orobanche rosmarina* Beck in Oesterr. Bot. Z. 70: 243 (1921) [basiónimo]

*O. mariana* A. Pujadas in Acta Bot. Malac. 32: 270 (2007)

*O. pseudorosmarina* A. Pujadas & Muñoz Garm. in Acta Bot. Croat. 69(1): 3 (2010)

*O. rumseiana* A. Pujadas & P. Fraga in Candollea 67: 66 (2012)

Planta anual o perenne, perteneciente a la familia *Orobanchaceae*, de hasta 30(37) cm de altura (obs. pers.), parásita del romero (*Rosmarinus officinalis* L.), que en el terreno estudiado crece sobre suelos preferentemente de naturaleza caliza y a veces margo-yesosos. Considerada en *Flora iberica* un endemismo de distribución mal conocida y con presencia en diversos puntos del S de la Península —España y Portugal— y Baleares (cf. Foley, 2001: 37), mientras que para el Grupo Botánico Cantábrico, ampliamente distribuida por la Región Mediterránea (cf. Carlón *et al.*, 2008: 71-79; Sánchez Pedraja *et al.*, 2016), e incluiría en su varibilidad a otras parásitas del romero que han sido descritas con posterioridad: *O. mariana*, “se conoce sólo del suroeste de la Península Ibérica” ... “en las provincias de Ciudad Real, Córdoba y Sevilla” (cf. Pujadas, 2007: 272); *O. pseudorosmarina*, descrita de Dalmatia, Croacia (cf. Pujadas y Muñoz Garmendia, 2010: 5); y *O. rumseiana*, solo conocida de Mallorca y Menorca, Islas Baleares (cf. Pujadas y Fraga, 2012: 69-70). Figuras 17-20.

Esta planta no pasó desapercibida al insigne botánico Carlos Pau, pues la herborizó en 1892, no muy lejos de nuestra zona de estudio, en la sierra del Negrete [“Sierra Negrete”], Utiel (Valencia) y la denominó “*Kopsia cyanea* Pau”, según se lee en la etiqueta del pliego testigo (herbario de C. Pau, MA 114852!). No consta que dicha combinación fuese publicada (cf. Carlón *et al.*, 2008: 70).

Las citas que aportamos constituyen novedad para la provincia de Albacete y nuevas citas para la de Valencia, de donde por el momento solamente se conoce de Utiel, Onteniente, Enguera y Requena (cf. Carlón *et al.*, 2008: 75; Oltra, 2014: 85; Mateo, 2019: 48; Mateo, 2020: 100).

**ALBACETE: 30SXJ4851**, 633 m, Casas de Ves, El Horrando. Margen de camino en zona forestal, sobre margas. Parásita de *Rosmarinus officinalis*. J. Gómez, 12-8-21 (v. s.). **30SXJ5026**, 1115 m, Carcelén, pr. Cerro de Iniesta. Pinar con encinas arbustivas, en ladera, sobre suelo calizo. Parásita de *Rosmarinus officinalis*. J. Gómez, 19-6-20 (J. GÓMEZ 3311). **30SXJ5148**, 675 m, Balsa de Ves, pr. Inicio del camino de bajada hacia la mina. Margen superior del camino, sobre material calizo. Parásita de *Rosmarinus officinalis*. J. Gómez, 11-6-20 (v. v.). **30SXJ5248**, 689 m, Balsa de Ves, pr. Herradurilla. Margen de camino elevado sobre material calizo. Parásita de *Rosmarinus officinalis*. J. Gómez, 14-6-20 (J. GÓMEZ 3306). **30SXJ5348**, 698 m, Balsa de Ves, Camino de la Mina del Viso a la Balsa. Talud inferior del camino, sobre material calizo. Parásita de *Rosmarinus officinalis*. J. Gómez, 11-6-20 (v. v.). **30SXJ5552**, 517 m, Balsa de Ves, Corral de