

Cicindela (Lophyra) flexuosa flexuosa (Fabricius, 1787)

Elemento mediterráneo. Especie halófila: marzo a julio. Embalse de Taibilla, Lagunas de Horna, Ruidera. Salobralejo. Salinas de Pinilla.

Myriochila (Myriochila) melancholica melancholica (Fabricius, 1798)

Elemento etiópico-oriental. Especie halófila. sus hábitats preferidos son zonas cultivadas de regadío y márgenes de zonas encharcadas; atraída por la luz artificial, permaneciendo en la zona iluminada donde caza otros insectos: julio, agosto y septiembre. Embalses de Camarillas y Talave, Saladar de Cordovilla. Salinas de Pinilla.

Subfamilia PAUSSINAE

Tribu **Paussini**

Paussus (Flagellopaussus) favieri (Fairmaire, 1851)

Elemento mediterráneo occidental. Especie lapidícola: marzo a mayo. Embalse de Talave

Subfamilia CARABINAE

Tribu **Carabini**

Calosoma (Campalita) maderae (Fabricius 1775)

Elemento mediterráneo occidental. Especie higrófila. Saladar de Cordovilla.

Carabus (Mesocarabus) lusitanicus latus Dejean, 1826

Elemento ibérico. Especie lapidícola: febrero a julio y de septiembre a noviembre. Embalses de Camarillas, Fuensanta y Talave. Lagunas de Ruidera.

Carabus (Rhabdotocarabus) melancholicus costatus Germar, 1824

Elemento ibero-marroquí. Especie ripícola: junio y noviembre. Lagunas de Arquillo y Ruidera.

Tribu **Nebrini**

Leistus (Leistus) fulvibarbis Dejean, 1826

Elemento mediterráneo. Especie lapidícola; enero a mayo y de octubre a noviembre. Embalse de Taibilla. Saladar de Cordovilla.