

Dyschiriodes (Dyschiriodes) chalybeus (Putzeys, 1846)

Elemento mediterráneo. Especie halófila, paludícola, junio y julio. Lagunas de los Patos (Hellín), Pétrola y Salobralejo.

Dyschiriodes (Dyschiriodes) macroderus breiti Müller 1922

Elemento mediterráneo. Especie halobia, de marzo a junio. Saladar de Cordovilla

Dyschiriodes (Dyschiriodes) punctatus (Dejean, 1825) (incluye *D. attenuatus* Putzeys, 1866)

Elemento mediterráneo occidental macaronésico. Especie higrófila y ripícola; mayo, junio y julio. Lagunas de Ruidera y Sugel.

Dyschiriodes (Dyschiriodes) salinus (Schaum, 1843)

Elemento paleártico occidental. Especie halobia; mayo a agosto. Lagunas de Horna, Pétrola y Ruidera.

Dyschiriodes (Eudyschirius) importunus (Schaum, 1857)

Elemento mediterráneo. Especie halobia. Saladar de Cordovilla.

Tribu **Scaritini**

Subtribu Scaritina

Distichus (Distichus) planus (Bonelli, 1813)

Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila; febrero a noviembre. Embalse de Camarillas. Lagunas de Casas de Villora, Corralrubio, Horna y Pétrola. Saladar de Cordovilla.

Scarites (Parallelomorphus) terricola Bonelli, 1813

Elemento mediterráneo septentrional. Especie halófila. Laguna de Pétrola, Saladar de Cordovilla.

Tribu **Trechini**

Subtribu Perileptina

Perileptus (Perileptus) areolatus (Creutzer, 1799)

Elemento mediterráneo. Especie ripícola; abril a junio y en septiembre. Embalse de Talave, Laguna de Ontalafía.