

Ataxioceras (*Ataxioceras* o *Schneidia*) sp.

Material: Numerosos ejemplares.

Descripción: Conservación defectuosa de fragmoconos que muestran dobles bifurcaciones; no es posible la obtención de relaciones paramétricas fiables. Existen formas de costulación fina, poco compleja y que muestran constricciones (*A. (Schneidia) sp.*). No se puede descartar su pertenencia a *Ataxioceras*, aunque el tamaño de los fragmentos parece excluir esta posibilidad.

Distribución geográfica: Los ejemplares se han recolectado en los perfiles de Fuente Alamo y Elche-Férez.

Distribución estratigráfica: Los ejemplares provienen de la parte somital de la Zona Platynota.

FORMAS DE POSICIÓN SISTEMÁTICA INCIERTA

GÉNERO SUTNERIA ZITTEL, 1884

Especie tipo: *Nautilus platynotus* REINECKE, 1818.

Sutneria platynota (REINECKE)

Sinonimia:

- | | |
|-------------|---|
| 1877 | <i>Ammonites (Perisphinctes) platynotus</i> REINECKE in FAVRE, p.47, lám.5/fig.2. |
| 1876-78 | <i>Ammonites (Perisphinctes) platynotus</i> REINECKE in LORIOL, lám.XV/figs.1,2. |
| 1887-88 | <i>Ammonites platynotus</i> (REINECKE) in QUENSTEDT, p.999, lám.112/fig.6. |
| 1887-88 | <i>Ammonites reineckianus</i> QUENSTEDT, p.1001, 1002, lám.112/figs.7-14, p.1020, lám.116/fig.14. |
| non•1887-88 | <i>Ammonites reineckianus</i> QUENSTEDT, p.1002, lám.112/figs.16,17. |
| 1961 | <i>Sutneria (Sutneria) platynota</i> (REINECKE) in GEYER, p.131, lám.3/figs.11,12. |
| 1970 | <i>Sutneria (Sutneria) platynota</i> (REINECKE) in SCHAIRER, p.155, lám.1/figs.1-12, lám.2/figs.1-13. |
| 1977 | <i>Sutneria platynota</i> (REINECKE) in ZIEGLER, lám.3/fig.3. |
| 1978 | <i>Sutneria platynota</i> (REINECKE) in OLORIZ, p.371, lám.39/fig.2. |