

*Bembidion (Nepha) schmidti alluaudi* Antoine, 1925

Elemento bético-rifeño. Especie ripícola: abril y mayo. Embalse de Taibilla.

*Bembidion (Notaphemphanes) ephippium* (Marshan, 1802)

Elemento atlántico mediterráneo. Especie halobia, paludícola: mayo, junio y julio. Lagunas de Horna, Hoya Rasa, Mojón Blanco, Pétrola, Saladar y Salobralejo, Salinas de Pinilla.

*Bembidion (Notaphus) varium* (Olivier, 1795)

Elemento paleártico occidental. Especie halófila, ripícola y paludícola: febrero a septiembre. Embalses de Camarillas, Fuensanta, Taibilla y Talave, Lagunas de Arquillo, Casas del Cerro, Casas de Villora, Horna, Hoya Rasa, Ontalafia, Pétrola, Ruidera, Saladar, Salobralejo y Sugel, Saladar de Cordovilla, Salinas de Pinilla.

*Bembidion (Ocydromus) decorum decorum* (Panzer, 1800)

Elemento mediterráneo. Especie higrófila; marzo a octubre. Embalses de Fuensanta y Taibilla, Laguna de Pétrola.

*Bembidion (Ocydromus) siculum* Dejean, 1831

Elemento mediterráneo. Especie ripícola: abril a junio. Embalse de Taibilla.

*Bembidion (Omoperiphus) hypocrita* Dejean, 1831

Elemento mediterráneo. Especie ripícola, abril a junio. Embalse de Taibilla.

*Bembidion (Peryphaness) maroccanum* Antoine, 1823

Elemento bético-rifeño. Especie ripícola: abril a julio, octubre y noviembre. Embalse de Taibilla.

*Bembidion (Peryphus) cruciatum cruciatum* Dejean 1831 (andreae auctt., non Fabricius 1797)

Elemento paleártico occidental. Especie ripícola: abril a septiembre. Embalses de Cenajo, Fuensanta y Taibilla.

*Bembidion (Peryphus) tetracolum tetracolum* Say, 1823

Elemento holártico. Especie ripícola: abril a octubre. Embalse de Taibilla.