

Distribución geográfica: Perfiles de Elche-Férez y Fuente Alamo.

Distribución estratigráfica: Registrada también en el Prebético Central, su distribución es Kimmeridgiense inferior, Zona Platynota.

Sutneria galar (OPPEL)

Sinonimia:

- 1863 *Ammonites galar* OPPEL, p.234, lám.67/fig.5.
 1878 *Ammonites (Perisphinctes) galar* OPPEL in LORIOLE, p.90, lám.15/fig.5.
 1879 *Perisphinctes galar* OPPEL in FONTANNES, p.75, lám.11/fig.5.
 ? 1887-88 *Ammonites reineckianus* QUENSTEDT, p.1002, lám.112/fig.17.
 1959 *Sutneria galar* (OPPEL) in BARTHEL, p.59, lám.6/figs.8-10.
 1961 *Sutneria (Sutneria) galar* (OPPEL) in GEYER (*partim*), p.132, lám.4/fig.7.
 1964 *Sutneria galar* (OPPEL) in HÖLDER, p.242, fig.73-2.
 1969 *Sutneria galar* (OPPEL) in GEYER, p.65, fig.1.
 1977 *Sutneria galar* (OPPEL) in ZIEGLER, p.19, lám.2/fig.3.
 1994 *Sutneria galar* (OPPEL) in OLORÍZ & RODRIGUEZ-TOVAR, lám.2/figs.5-18.

Material: 9 ejemplares.

Medidas:

	D	O	O/D	CU ₂	CE ₂	IC
FA-Oxf		9.5		0.18	9	22?
FA-4(19)	22.5	5	0.22	8	27	33
FA-4(200)	19.8	4.5	0.23	10	30	30
FA-4(201)	20.7	5.9	0.29	9-10	31	28
FA-4(202)	22.3	5.7	0.26	10	32	32
FA-4(203)	17.6	4.8	0.27			
FA-4(219)	18.4	4.7	0.26	10	29	29
FA-4(229)	19	4.3	0.23	9-10	>26	>26
FA-4(237)	19.6	5.7	0.29	8	27	32

Diagnosis: Pequeña, involuta y con sección subredondeada. Costulación bifurcada a poligirada-fasciculada con residuales en la última vuelta. Desvanecimiento preperistomal ligero. Peristoma pedunculado.