


El Campo de Montiel

Es la comarca más diversa, y en la que mayor esfuerzo de censo se ha invertido con 100 km de itinerario por temporada. Nos ofrece un IKA medio de 9.9 rapaces / 100 km, que es justo la media del total de la zona muestreada, y una riqueza media de 3.4 especies, aunque en el transcurso de los 10 años, están representadas 9 de las 10 especies detectadas en el total del territorio, incluyendo como especie los indeterminados.



Graf. 3. Abundancia (IKA) y riqueza de especies para el periodo de estudio en la comarca C. Montiel

Graph 3. Abundance and richness of species for the period under study in the region of C. de Montiel.

Esta subcomarca manchega, está compartida entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. En la parte ciudarrealense en 1993 Guzmán (com. pers.) ofrece un IKA de 8.2 aves / 100 km, y Castaño, 2002 da el dato de 3.3 aves / 100 km, aunque este último dato hay que tomarlo con las debidas precauciones porque se trata de un transepto en época primaveral. Igualmente (López Sánchez, M. Inedito) en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, espacio natural que está incluido en esta subcomarca, obtiene una abundancia relativa de 20.3 rapaces / 100 km., aunque nuevamente hay que tomar el dato solamente como referencia, pues se trata de un lugar que está ocupado por abundantes dormideros invernales, sobre todo del género *Circus*.

En la evolución de la abundancia a lo largo del periodo, destaca el pico en el invierno 1997-1998, seguido del invierno posterior y el brusco descenso en las siguientes tres temporadas.