


Las especies más detectadas han sido:

Especie	Ft	Bb	Fc	Ach	Ccy	Ca	Atn	Atn	Ind
Nº cont.	41	39	1	2	2	3	2	1	7
%	41.8	39.7	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	7.1

Ft- *Falco tinnunculus*, Bb- *Buteo buteo*, Fc- *Falco columbarius*, Ccy- *Circus cyaneus*, Ca- *Circus aeruginosus*, An- *Acipiter nissus*, Ach- *Aquila chrysaetos*, Atn- *Athene noctua*, Ind- Indeterminado.

La Presierra de Alcaraz

Es la zona en la que se ha invertido menos esfuerzo. La consideramos como una zona de comunicación o de paso en la ruta planificada para este trabajo, pero que por poseer una morfología diferente al resto de territorios censados, y a pesar de la baja representatividad en kilómetros dentro del total, hemos considerado tratarla como una zona más.



Graf. 4. Abundancia (IKA) y riqueza de especies para el periodo de estudio en la comarca P. Alcaraz.

Graph 4. Abundance and richness of species for the period under study in the region of Alcaraz.

Esta zona aporta un IKA medio de 4.6 rapaces / 100 km y una riqueza media de 1.7 especies, estando presentes 4 de las 10 que aparecen en el total del trabajo durante la época de muestreo. Las especies más frecuente son *Buteo buteo* y *Falco tinnunculus*