

Busardo ratonero (*Buteo buteo*)

El B. ratonero ofrece un IKA medio de 3.6 individuos / 100 km. Es la segunda especie más detectada. Ocupando el 37.9 % en el total de los censos.


Estos datos de abundancia quedan por debajo de los que se ofrecen para otras partes de la Península Ibérica:

Presente trabajo (1996-2006)	Sunyer et al. (1996) España	De Juana et al. (1987) Iberia
3.6 ind / 100 km	7.5 ind / 100 km	4.5 ind / 100 km

Nuevamente selecciona para la invernada las grandes llanuras manchegas, aunque en este caso, sospechamos que se trata de ejemplares foráneos, o vecinos al no presentar la zona condiciones para la cría. Quizás pertenezcan del cercano Campo de Montiel, que tiene un carácter más montaraz, y ofrece, mejores condiciones para la cría de esta especie.



El único control que tenemos en la zona de esta especie, se trata de un ejemplar que se soltó en Ojos de Villaverde (El Ballestero) y se recuperó 55 días después (en noviembre de 1999) casi en el mismo lugar de su suelta. Este control reforzaría la teoría de Bernis (1966), de que la especie se comporta como sedentaria estricta, y que la mayor o menor abundancia corresponde a una cierto grado de dispersión. En la gráfica se pueden observar importantes fluctuaciones dentro del periodo.



Graf. 7. Número de *Buteo buteo* por invernada en el área de estudio.

Graph 7. Number of *Buteo buteo* per wintering period in the area under study.