

**Gavilán** (*Accipiter nissus*)

El IKA de 0.17 ind / 100 km. que nos da esta rapaz, al igual que en la especie anterior, creemos que no es representativo de su abundancia real, que consideramos, dentro de lo discreto y esquivo de su comportamiento, como mas alta. Su carácter de ave más forestal y su instalación en zonas de monte espeso, hace que no sea este método de censos por carretera el mejor para el control de sus poblaciones.

De las 3 observaciones conseguidas para esta rapaz, 2 han sido en la comarca del Campo de Montiel, una entre cultivos con presencia de espesas lindes de encinas y otra en vuelo dentro de un espeso sabinar. La última observación se realizó en plena Mancha, cazando a baja altura sobre cultivos de viñedo tradicional.

**Mochuelo común** (*Athene noctua*)

Incluimos aquí, esta pequeña rapaz nocturna por sus hábitos crepusculares, cuyas dos observaciones, en absoluto le hacen justicia a su abundancia real. Seguimientos realizados para esta y otras rapaces nocturnas, por medio de programas como el “Noctua” o con la emisión de reclamos, nos ofrecen unas densidades de 2.7 ind / 25 km<sup>2</sup> para la zona oeste de este trabajo (datos propios e inedit.); y una media de 7,33 contactos por cuadrícula 10x10 para Castilla-La Mancha (Escandell, 2005).

**Indeterminados**

Las 9 observaciones que hemos incluido en el epígrafe como indeterminados, aparecen con las siguientes descripciones:

96-97	1	posiblemente <i>Buteo</i>
97-98		
98-99		
99-00		
00-01		
01-02		
02-03	1	Rapaz de tamaño medio
03-04	2	Rapaz de tamaño medio
	1	<i>Circus sp.</i>
	1	Rapaz pequeña
04-05	1	Indeterminado
05-06	1	Posiblemente <i>Buteo</i>
	1	Rapaz de tamaño medio