

- Vegetación compuesta por pequeños helodeidos, batráchidos y miriofílidos de aguas poco profundas, representada por *Ranunculus peltatus*.

Otra comunidad vegetal dominada por carófitos se desarrolla en estanques y lagunas, sobre suelos arenosos y sustratos fangosos. Esta representada por *Lamprothamnium papulosum*.

Conforme nos alejamos de la lámina de agua catenalmente aparecen otras comunidades vegetales compuestas por plantas hidrófilas enraizadas con grandes helófitos e hierbas jugosas helófitas, propias de bordes de cursos de agua, lagunas, lodos húmedos durante gran parte del año.

Por una parte están los carrizales, espadañales y junciales, que se sitúan en márgenes de ríos, lagunas, arroyos, etc. de aguas dulces con poca corriente.

Más alejado de la masa de agua aparece el masegar de *Cladium mariscus*, con apetencias por ecotopos higrófilos dulceacuícolas mesooligotrofos que tienden a la turberización.

A continuación aparece otra comunidad dominada por *Carex hispida* y *Cladium mariscus*, desarrollada en suelos húmedos de textura arcillosa que se endurecen con la desecación estival.

En los arroyos y ríos con corrientes de curso rápido aparece una comunidad de plantas compuesta entre otros por *Apium nodiflorum*, *Verónica anagallis-aquática* y *Nasturnium officinale*.

En suelos profundos no salinos que mantienen algo de humedad edáfica durante el estío se desarrollan los junciales de *Scirpus holoschoenus* y *Cirsium pyrenaicum*.

En suelos hiperhalófilos y húmedos todo el año, se desarrollan otro tipo de junciales en cuyo catálogo florístico destacan *Juncus marítimus*, *Sonchus marítimus* y *Sonchus crassifolius*.

Conformme nos alejamos de la lámina de agua, y en suelos salinos ricos en sodio, que pueden estar o no encharcados durante periodos más o menos prolongados, aparece una comunidad vegetal compuesta por plantas de hojas arrosetadas y albardines de *Lygeum spartum*.