

3. RESULTADOS. RELACIÓN DE ESPECIES

3.1. *Pleurodeles waltz* (Gallipato)

Se distribuye por España, Portugal y el norte de Marruecos, apareciendo en la Península Ibérica en los dos tercios meridionales.

En el Campo de Montiel albacetense ha sido localizado en las cuadrículas WJ10, WJ41, WJ42, WJ52 y WH39. Estas cuadrículas se encuentran situadas en puntos diferentes del territorio a estudiar. De manera que engloban la mayoría de los hábitats que aparecen en el Campo de Montiel y de ello se deduce que probablemente aparezca en todas o casi todas las cuadrículas que aparecen en blanco, y en las que no ha sido localizado por déficit de muestreo.

P. waltz ha sido localizado en una gran variedad de hábitats, eso sí, relacionados todos ellos con el agua. Este urodelo ha sido localizado en época de freza, que en el Campo de Montiel parece ocupar los meses primaverales, desde abril a mayo, en hábitats como charcas utilizadas para el ganado ovino y caprino para abreviar y las cuales se pueden considerar como verdaderos oasis en medio de un mosaico de encinar y campo de cultivo con déficit hídrico; en pozas o remansos de arroyos; en balsas de



Pleurodeles waltz. Casa Nova (Munera). L. E. Tarancón Vinuesa.