

riego y en complejos lagunares de agua dulce o salobre, como ocurre en las salinas de Pinilla.

Es un anfibio que soporta bien la salinidad, aspecto éste que se ha comprobado al encontrar varios ejemplares en las aguas hipersalinas de Pinilla.

Es una especie ligada al ecosistema mediterráneo que no se aleja mucho de los puntos de agua, pero que para desarrollar su ciclo vital no necesita grandes caudales de agua, encontrándose en encharcamientos algo efímeros.

También se han localizado ejemplares de tamaño considerable, pero que conservan los caracteres larvarios como branquias. Éstos son animales neoténicos que pasan todo el año en el agua y son capaces de reproducirse en este estadio cuando llega la época de reproducción.

En cuanto a los problemas de conservación a los que se enfrenta la especie en la zona, se ha podido comprobar que muere un elevado número de ejemplares ahogados en balsas de riego o piscinas en la época de reproducción, al igual que le pasa a otras especies de anfibios, ya que el animal se introduce en el agua atraído por ella, pero no puede salir porque encuentra una barrera formada por las paredes verticales de la balsa.

Otro problema al que se enfrenta la especie en el territorio es el coleccionismo, de manera que algunos ejemplares se han llegado a poner en venta, incluso, en grandes superficies comerciales. Este aspecto puede afectar, sobre todo, a poblaciones que viven alejadas unas de otras. Ya que si, dentro de estas poblaciones existe un régimen de extracción de ejemplares mayor que de renovación, bien sea procedente de natalidad dentro de esa subpoblación o inmigración de otra subpoblación cercana, se podrían producir extinciones locales de la especie.

### 3.2. *Triturus pygmaeus* (Tritón pigmeo)

Es una especie de urodelo cuya distribución abarca la mitad sur de la Península Ibérica.

En el presente estudio ha sido localizado en la laguna Ojos de Villaverde y lagunas altas de Ruidera.

Siguiendo la bibliografía, las últimas citas conocidas en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, del año 1998, proceden de la parte alta de las lagunas, la zona que abarca la Laguna Blanca, el Río Pinilla y manantiales de los que mana el agua que va a parar a las lagunas inferiores.

*Triturus pygmaeus*, quizás abarcase tiempo atrás una porción