

siderable, y es difícil que se desequie en el estío. El segundo lugar es un manantial rodeado de juncuales que se encharcan estacionalmente y que normalmente se desecan en la época estival, y dependiendo de las precipitaciones de cada año. Además este lugar está alejado bastantes kilómetros de un punto de agua importante, con lo que se concluye, que este anfibio puede aparecer en más cuadrículas de las que se ha localizado, pero que no se ha localizado ya que permanece bastante tiempo enterrado y es de difícil detección.

Es un anfibio de costumbres discretas, que suele elegir para vivir lugares abiertos, poco escarpados, con sustrato arenoso donde puede escabar para enterrarse por medio de la espuela endurecida que posee en las extremidades posteriores.

El periodo larvario dura bastante, entre 3 y 7 meses, en el cual los renacuajos crecen mucho. Siendo la especie de anuro con los renacuajos mayores, alcanzando hasta 14 cm, alrededor de 8-10 cm en los que han sido encontrados en el Campo de Montiel.

Es de resaltar que sus poblaciones dependen directamente de las precipitaciones, ya que si no llueve lo suficiente, las charcas no se llenan adecuadamente de agua, con lo que no realizan la puesta, o si la realizan, los reancuajos mueren al desecarse la charca, todo ello debido al prolongado periodo larvario.

Ha sido constatado que en el último lugar nombrado no han realizado la puesta en el año 2001, lo que significa, que ese año no se realiza cambio generacional en la población mencionada.

En cuanto al estado de conservación de sus poblaciones, es de señalar, que además de enfrentarse a los problemas a los que lo hacen otros anfibios, es sensible a las extracciones de agua que se realizan por parte del hombre, ya que si esas extracciones se efectúan de forma abusiva y en un año seco, este animal puede a llegar a no reproducirse ese año. El problema viene si se repite este ciclo muchos años seguidos.

3.5. *Pelodytes punctatus* (Sapillo moteado)

El sapillo moteado es una especie que se distribuye por Iberia, pasando por Francia, hasta el noroeste de Italia. En Iberia falta en Galicia, Cordillera Cantábrica, tercio norte de Portugal, norte del País Vasco y el sector más occidental de Castilla-León.

Recientemente se ha diferenciado otra especie de sapillo moteado en la Península, que sustituye a *Pelodytes punctatus*, en el centro y sur de