

Familia *CATOPIDAE*  
CATOPIDOS

*Catops atlanticus* Szymczakowski, 1970

Hasta hace poco tiempo estaba considerada como endemismo de Marruecos. BLAS (1983) la incluye en la fauna ibérica con citas de algunas localidades andaluzas. Esta especie cavernícola la hemos capturado en la cueva del Farallón de Riópar (30-XI-85), siendo la primera cita para la provincia.

*Speonemadus angusticollis* Kraatz, 1870

Se trata de una especie cavernícola distribuida por el suroeste y centro de la Península Ibérica (BLAS, 1977). La hemos capturado en la cueva del Farallón de Riópar (30-XI-85 y 20-II-87). Cita nueva para la provincia.

Familia *HISTERIDAE*  
HISTERIDOS

*Chalcionellus (Izpaniolus) aemulus* (Illiger, 1807)

Especie euroturánica citada por YELAMOS & DE FERRER (1988) de la sierra de Segura. Según estos autores se trata de una especie poco frecuente que se encuentra en excrementos de vaca y caballo así como en cadáveres de animales.

*Hypocacculus (s. str.) spretulus* (Erichson, 1843)

Es una especie eurocentroasiática poco frecuente. Se encuentra en materia orgánica en descomposición. YELAMOS & DE FERRER (1988) la citan de la Sierra de Alcaraz.

*Platylomalus gardineri* (Scott, 1913)

Esta rarísima especie es un endemismo de las islas Seychelles. La hemos capturado (20-I-85) bajo cortezas de *Robinia pseudoacacia* L. en la cercana localidad murciana de Jumilla, es la primera vez que se la captura en el continente europeo.

Familia *BRENTHIDAE*  
BRENTIDOS

*Amorphocephalus coronatus* (Germar, 1813)

Especie mirmecófila propia de la zona mediterránea. Es muy esporádica. La hemos capturado, atraída por la luz artificial, en Tus (5-VII-87) y Riópar (27-VII-84).