

<i>Thymus vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Fig. 5).		<i>Thymus × monrealensis</i> nothosubsp. <i>peris-gisbertii</i> , <i>nothosubsp. nov.</i> (Figs. 15 y 16).	<i>Thymus zygis</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Fig. 4).	<i>Thymus × monrealensis</i> nothosubsp. <i>conquensis</i> (Figs. 1 y 2).
Hábito	Tallos erectos o decumbentes, radicantes.	No	Tallos de crecidos a decumbentes y radicantes	Tallos erectos, decumbentes y radicantes
Longitud	30-100 mm.	30-100 mm.	40-110 mm.	30-100 mm.
Color	Rojizos o algo amarillentos.	0,5-1 mm.	Rojizos o algo amarillentos.	Rojizos o algo amarillentos.
Diametro	0,3-0,8 mm.	-Pubescentes; pelos retrorsos, aplicados, < 0,2 mm de longitud.	0,05-0,3 mm.	0,5-0,8 mm.
Indumento de la parte media superior	-Cíngulas esteroïdale amarillas	-Pubescentes; pelos retrorsos, de 0,15(0,2) mm de longitud.	-Pubescencias a subhirsutas; pelos en general retrorsos de 0,1-0,3 mm de longitud.	-Glandulas esteroïdale amarillas
Forma	-Lineares, ovado-lanceoladas o lanceoladas, agudas, ± subopuestas, revoluta, con fascículos axilares.	Ovado-lanceoladas, agudas, ± subopuestas, margen revoluta, con fascículos axilares.	Lineares, puntiagudas, margen revoluta, con fascículos axilares.	-Lineas oblongas a ovado-lanceoladas, subobtusas, subopuestas, margen revoluta, con fascículos axilares.
Tamaño	3,7 × 0,75-1,5 mm.	(25,8 × (0,50-7,1 mm.	4-(0,11) × (0,50-7,0)(0,9) mm.	4-6,5 × 1-1,5 mm.
Hojas	-Pelos cortos	-Pelos cortos.	-Pelos cortos.	-Pelos cortos.
Indumento	-Glandulas esteroïdale amarillas.	-Glandulas esteroïdale amarillas.	-Glandulas esteroïdale generalmente rojizas.	-Glandulas esteroïdale amarillas.
Sin cilios basales.		Cilios basales de 0,1-0,5(0,75) mm. o bien ausentes.	Cilios basales de 0,5-1,5 mm.	Cilios basales de 0,1-0,5(0,75) mm. o bien ausentes.
Longitud de la inflorescencia	5-20(25) mm.	5-20(25) mm.	5(10)-35 mm.	10(20)-40 mm.
Nº de verticilos separados	1	1(2)	1-2(3)	1(2)-4(5)
Básculas inferiores	Forma	Igual que las hojas superiores o algo más anchas. No sobresalen en anchura a la inflorescencia.	Como las hojas superiores, en general que sobresalen de la inflorescencia, patentes a ligera mente erecto-patentes	Algo más anchas que las hojas, ovado-lanceoladas, márgenes revolutos, que igualan ± en anchura la inflorescencia (no sobresalen, o apenas lo hacen).
Tamaño	4,5-6 × 0,4-1,8 mm.	(6,7-8,9) × (0,8)1,2-2,3 mm.	7,9(1) × 0,6-0,8 mm.	5,6-5 × 1-2 mm.
Cilios basales	Sin cilios	Más cortas, ovado-lanceoladas	0	Ausentes o muy cortos, 0,1-0,2 mm de long.
Básculas superiores; forma	Más cortas, ovado lanceoladas	0	Más cortas, ovado-lanceoladas	Más cortas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, con tendencia a margen desplegado.
Pedicelo de las flores; longitud	1-2(2,5) mm.	1-2,5(3,5) mm.	1-2(2,5) mm.	1-2,5 mm.
Flor	Fertil. Anteras purpúreas.	Esteril. Anteras estériles.	Fertil. Anteras purpúreas.	Fertil. Anteras purpúreas.
Tamaño	3,5-4 mm.	3,5-4(4,3) mm.	3,5-4,5 mm.	3-4 mm.
Long. dientes inferiores	2 mm.	2-2,5 mm.	2,2-2,7 mm.	2 mm.
Cilios dientes inferiores	0,1-0,3 mm.	0,1-0,2 (0,5) mm.	0,1-0,3 (0,5) mm.	0,2-0,5 (0,7) mm.
Tamaño diente superior central (altura x base)	0,5-1 × 0,5-0,8 mm (en general iguala a sus adláteros)	0,5-1 × 0,5-0,75(1) mm.	(0,75)-1-1,5 × 0,5-0,8 mm.	0,5-0,8(1) × 0,6-0,8(1) mm., brevemente ciliada.
Cáliz	Glandulas: forma y color	-Glandulas esféricas transparentes o amarillas.	-Glandulas esféricas rojas (rara vez amarillas).	-Glandulas esféricas amarillas.
Indumento	Pelos	-Sin glandulas pedunculadas.	-Con glandulas pedunculadas (más escasas que en la subsp. <i>sylvestris</i>).	-Sin glandulas pedunculadas.
Corola	longitud color	4,5-5 mm.	3,8-4(4,5) mm.	4,5-5(5,5) mm.
		Blanca o blanca-rojada.	Blanca o blanco-rojada.	Blanca o blanco-rojada.

Tabla 1.- Diferencias encontradas entre *Thymus vulgaris* subsp. *vulgaris*, *Th. × monrealensis* nothosubsp. *peris-gisbertii*, *Th. zygis* subsp. *sylvestris* y *Th. × monrealensis* nothosubsp. *conquensis*. (Datos obtenidos de ejemplares de la zona, salvo en el último nototaxon que se basan en el holotipo).