

(= *Cidarelle* Desmoulins, 1835).

*Características.* Ambulacros estrechos con placas bigeminadas u, ocasionalmente, con alguna simple.

*Salenia grasi* (Cotteau, 1861) (Figura 1.)

1861 *Salenia grasi* Cotteau.

1997 *Salenia grasi* Cotteau; Santolaya y Sillero, VII, Fasc. 11-12, 270 bis, pp. 19-20.



Figura 1. CJLG AP2

Criterios de determinación

Especie de pequeño tamaño, circular, redondeada por los bordes, casi plana por arriba y por debajo.

Sistema apical algo abombado, liso, de aspecto estrellado, con impresiones suturales redondeadas y profundas. Placas genitales alargadas, de aspecto lanceolado, que se prolongan en forma de hoja en el interambulacro y perforadas en el centro. Placas oculares estrechas con forma de U, arropando la terminación del ambulacro.

Ambulacros estrechos, prominentes, no flexuosos, con dos filas de gránulos algo más voluminosos en la base. Las dos filas de gránulos están muy próximas entre sí, aunque entre ellas existen verrugosidades muy pequeñas, especialmente en el ámbito, donde el ambulacro se ensancha un poco para dar cabida a gránulos más grandes. Zonas poríferas rectas, superficiales, formadas por pequeños poros muy próximos, iguales entre sí, dispuestos algo oblicuamente y un poco desviados de la línea recta en las cercanías del peristoma.

Tubérculos interambulacrales poco abundantes, abultados y desiguales,