

Peristoma relativamente grande, redondeado y con hendiduras bucales muy patentes.

Posición estratigráfica: Eoceno.

Localidad: Cortijo de Sorbas (Letur).

Familia TOXOPNEUSTIDAE (Troschel, 1872)

*Características.* Tubérculos imperforados y no crenulados.

Género SCHIZECHINUS (Pomel, 1869)

*Características.* Forma externa subhemisférica. Placas ambulacrales trigeminadas, cada una de las cuales presenta un tubérculo primario. Tubérculos secundarios formando series regulares paralelas a las series primarias. Sistema apical en el que normalmente las placas oculares I y V están en contacto con el periprocto.

*Schizechinus duciei* (Wright, 1855) (Figura 9.)

1855 *Echinus duciei* Wright, p. 109-110 y 276, pl. 4, figs. 2a-2f.

1890 *Echinus duciei* Wright; Gregory, p. 590 y 638, pl. 1, fig. 6.

1908a *Schizechinus duciei* (Wright); Stefanini, p. 441-443, pl. 17, fig. 2.

1953 *Schizechinus duciei* (Wright); Szörenyi, p. 58-59, pl. 8, figs. 1-2.

1970 *Schizechinus duciei* (Wright); Montenat y Roman, p. 97-98, pl. A, figs. 6a,b.

1999 *Schizechinus duciei* (Wright); Santolaya y Sillero, VIII, Fasc. 15-16, 296, pp 18-19.



CPM