

- 6.3.81 *Kuchleria insignata* Hausmann, 1995: Elemento AM. Trivoltina (III-IV, VI-VIII y IX-XI). **LF: Ab: 15:** 16.V.2006; **125:** 24.VI.2005, 15.VII.2005; **221:** 13.V.2006. **DV:** 400-500 m.
- 6.3.82 *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789): Elemento EU. Univoltina (VI-VII). **CB: Ab:** WH51 [7]. **DV:** 1100 m.
- 6.3.83 *Phaiogramma etruscaria* (Zeller, 1849): Elemento ASM. Bivoltina (V-VI y VII-VIII). **LF: Ab: 27:** 20.VI.2003; **35:** 20.VIII.2002; **125:** 6.V.2005; **127:** 8.VIII.2003; **138:** V.1992; **148:** 7.VI.2003; **174:** 18.V.2003, 26.VIII.2003, 20.V.2006; **227:** 19.V.2007; **252:** 7.VII.2007. **CB: Ab:** WH56 [12]. **DV:** 360-1160 m.
- 6.3.84 *Phaiogramma faustinata* (Millière, 1868): Elemento ET. Polivoltina (IV-XI). **LF: Ab: 125:** 24.VI.2005; **127:** 8.VIII.2003; **174:** 20.VIII.2002. **DV:** 400-730 m.
- 6.3.85 *Microloxia herbaria* (Hübner, 1813): Elemento ASM. Polivoltina (V-VI, VI-VIII y VIII-IX). **LF: Ab: 15:** 18.IX.1998, 16.V.2006; **27:** 20.VI.2003; **76:** 18.IX.1998; **125:** 31.VIII.2006; **148:** 5.VII.2003; **209:** 20.V.2005, 22.VII.2006; **221:** 13.V.2006; **228:** 16.IX.2006. **DV:** 380-800 m.
- 6.3.86 *Lythria sanguinaria* Duponchel, 1842: Elemento AM. Univoltina (V-VI). **LF: Ab: 11:** 21.V.2006; **150:** 21.V.2006; **213:** 19.VI.2004. **DV:** 840-1480 m. (Ver Figura nº 2).
- 6.3.87 *Scotopteryx alfacaria* (Staudinger, 1859): Elemento AM. Univoltina (VII-VIII). **LF: Ab: 17:** 6.VII.2007; **45:** 19.VII.2003, 26.VIII.2003, 5.VIII.1992; **145:** 8.VII.2006; **213:** 23.VIII.2004, 30.VII.2005. **CB: Ab:** WH56 [12]; **Mu:** WH61-WH72 [6]. **DV:** 1450-1680 m.
- 6.3.88 *Scotopteryx octodurensis* (Favre, 1903): Elemento AM. Univoltina (VI-IX). **LF: Ab: 5:** 10.VII.1999; **45:** 19.VII.2003; **144** (WH45): 29.VI.2002; **213:** 23.VIII.2004, 11.IX.2004, 18.VI.2005, 30.VII.2005. **CB: Mu:** WH61-WH72 [6]. **DV:** 1365-1600 m.
- 6.3.89 *Scotopteryx peribolata* (Hübner, 1817): Elemento AM. Univoltina (IX-X). **LF: Ab: 21:** 1.X.2005; **23:** 22.IX.2006; **125:** 14.X.2006; **148:** 11.X.2003; **190:** 21.IX.2003 (A. Albadalejo leg.); **213:** 11.IX.2004, 2.X.2004. **CB: Mu:** WH61 [6]. **DV:** 450-1760 m.
- 6.3.90 *Nycterosea obstipata* (Fabricius, 1794): Elemento G. Bivoltina (V-VIII y X). **LF: Ab: 8:** 11.X.2006, 11.V.2007; **35:** 20.VIII.2002; **125** (XH04): 15.VII.2005; **138:** V-VI.1992; **174:** 18.V.2003, 21.VI.2003, 4.VI.2004, 20.V.2006; **240:** 17.V.2006. **CB: Ab:** WH56 [12]. **DV:** 520-950 m.
- 6.3.91 *Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758): Elemento H. Polivoltina (III-VIII). **LF: Ab: 8:** 18.V.2007; **138:** V.1992; **174:** 19.III.2004; **213:** 23.VIII.2004. **CB: Ab:** WH56 [12]. **DV:** 520-1480 m.