

desarrollan de una forma natural, estableciendo una resiembra, se podrían obtener praderas permanentes que condujeran a la mejora de esta zona de pastos, bastante devastada por el ganado, principalmente lanar.

Para la mejora de los pastos, es importante un estudio del pH del suelo, pues con un posible tratamiento con abonos se conseguiría su enriquecimiento. Los suelos ricos en carbonato cálcico favorecen la aparición y mantenimiento de **Poa** y **Festuca**, así como de **Aegilops**, **Brachypodium**, **Avena**, etc.; y los superfosfatos y nitratos incrementan la formación de leguminosas: **Trifolium**, **Vicia**, **Medicago**, **Onobrychis**, **Hypocrepis**, **Astragalus**, **Coronilla**, etc...

Otros géneros de resiembra abundantes son: **Arenaria**, **Minuartia**, **Dianthus**, **Petrorhagia**, **Myosotis**, **Lepidium**, **Hieracium**, **Alyssum**, **Senecio**, **Asphodelus**, **Narcissus**, **Cerastium**, **Silene**, **Cardamine**, etc. Todos ellos están incluidos en el catálogo de taxones que citamos a continuación.

Sobre cada especie se da: fecha de recogida, coincidente con la floración, frecuencia y abundancia de la misma, localidad y coordenadas U.T.M., con un número de registro; el mismo que figura en el catálogo florístico junto a cada especie.

Para facilitar la consulta de las diversas citas se han dispuesto por orden alfabético de géneros y especies.

En el mapa de la Fig. 1 se sitúa la zona de estudio, al Sur de la Provincia de Albacete.

El mapa de la Fig. 2 corresponde a la localidad de Yeste (Albacete), 1/50.000 (23-34) del mapa militar. Sobre él se ha superpuesto una decimalización de la cuadrícula U.T.M., siguiendo las normas de Flora Europea. Los cuadrados de 5 Km. de lado incluyen un número que se transcribe en la descripción de cada especie entre paréntesis, con lo cual se abrevia su localización.

## CATALOGO FLORISTICO DE TAXONES

- ACHILLEA MILLEFOLIUM ssp MILLEFOLIUM; L.- Floración Julio-Agosto. Sobre prados con algo de humedad. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 49-55. R. 6645.
- AEGILOPS GENICULATA L.- Floración mediados de Junio. Frecuente. Campamento de San Juan. WH 4758. Cañada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 9086.
- AEGILOPS NEGLECTA Regex, Bertol.- Común, con floración en Junio. Cañada de los Mojones (10) WH 48-55. Campamento de San Juan (3). WH 47-58. R. 6643.
- AETHIONEMA SAXATILE (L.) R. Br.- Común entre el lapiaz, aunque invade en pequeña proporción zonas de prados. Floración Mayo. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6503.
- AIRA TERNUIFOLIA L.- Floración Julio-Agosto. Frecuente en prados humbrosos. Cañada de los Mojones. (3). WH 48-55. R. 9087.
- ALYSSUM MONTANUM L. ssp MONTANUM.- Común, con floración de Marzo a Abril. Pedregales, pastos y zonas de lapiaz. Cañada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6506.